노지 작물 세균 병해에는

스타나마이신 수화제

스타나마이신
원예용
살균제

- **품목명** : 옥솔린산 – 10%,
  스트렙토마이신 – 15%
- **약효보증기간** : 4년
- **독성** : 저독성, 어독성Ⅲ급
- **포장단위** : 200g x 80EA,
  500g x 20EA
- **작용기작** : 가4+라4

- 세포분열 및 단백질 합성 동시 억제로 내성균에 효과적
- 과수 세균구멍병에 탁월한 효과
- 세균 증식 억제 효과 우수

적용병해 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
마늘	무름병	발병초 7일 간격 경엽처리	20g	수확 14일 전까지	4회 이내
매실	궤양병	낙화직후부터 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전까지	3회 이내
배	화상병	만개 5일 후 경엽처리		수확 120일 전까지	2회 이내
		만개 15일 후 경엽처리			
		만개 5일후부터 10일간격 경엽처리			
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전까지	3회 이내
양앵두(체리)				수확 7일 전까지	
양파	구썩음병	발병초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전까지	
사과	화상병	만개 5일 후 경엽처리		수확 30일 전까지	2회 이내
		만개 15일 후 경엽처리			
		만개 5일후부터 10일간격 경엽처리			
자두	세균구멍병	발병직전 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전까지	4회 이내
참다래(키위)	궤양병	3월하순부터 낙화직후까지 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전까지	3회 이내

주의사항

- 자두, 복숭아 신엽 생장기에는 약해 발생 위험이 있어 사용하지 마십시오.
- 세균병해는 예방위주로 방제가 필요합니다.
- 고온기 사용시 약해 우려가 있으므로 아침, 저녁 햇볕이 약할 때 방제 작업을 실시 하십시오.

스타나마이신 방제효과