

비오거나 날씨가 흐린 날에는 꼭 챙기세요

젬머

젬머
원예용 살균제

과립혼연제

- 이 농약은 카복사마이드계 살균제로서 숙신산 탈수소효소 저해제(SDHI)로 다양한 병원균에 효과가 있습니다.
- 이 농약은 포자의 침입 및 발아를 억제하고 균사의 생육을 저해하므로 예방과 치료효과를 동시에 발휘합니다.
- 이 농약은 침투이행성약제로서 약효지속성이 우수하여 뛰어난 방제효과를 보입니다.
- 이 농약은 사용이 간편하며 수확물에 대한 약흔이 전혀 없습니다.

적용병해 및 사용량


작물명	적용병해	사용시기 및 방법	사용약량
고추(단고추류 포함)	잿빛곰팡이병	발병초부터 7일 간격 혼연처리	150g/1,000㎡
딸기			
토마토 (방울토마토 포함)	잎곰팡이병		

- 품목명 : 플룩사피록사드 - 9%
- 약효보증기간 : 4년
- 독성 : 저독성, 어독성 I 급
- 포장단위 : 50g x 100EA
- 작용기작 : 다2

국내 시험 사진(딸기 잿빛곰팡이병) 동방아그로 기술연구소



방제효과



주의사항

- 이 농약은 온실, 하우스 전용약제이므로 일반노지 및 비닐터널재배에서는 사용하지 마십시오.
- 정식 직후나 유묘기, 연약한 묘에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 지나친 과습시에는 약해발생의 우려가 있으므로 관수 직후 또는 작물이 젖어 있을때나 하우스내에 안개가 자욱히 끼어 있을 때는 사용하지 마십시오.
- 이상고온이나 이상저온인 경우에는 작물이 연약한 상태이므로 사용을 피해주십시오. 또한 고온인 경우에는 온도가 낮아지는 저녁무렵에 하우스를 밀폐한 후 사용하십시오.
- 혼연시 곧바로 분출되는 짙은 연기가 식물체에 직접 닿을 경우 약해(죽음, 위축증상 등)의 우려가 있을 수 있으므로 약제와 작물체와의 거리를 50cm 이상 간격을 띄워주시고 과립혼연제의 열기에 의하여 비닐하우스가 손상될 우려가 있으므로 50cm 이상 충분한 간격을 유지하여 설치하십시오.

