

찬찬

찬 찬

원예용 살균제

입상수화제



- 품목명 : 이프로디온 - 30%, 트리플록시스트로빈 - 8%
- 약효보증기간 : 4년
- 독성 : 저독성, 어독성 I 급
- 포장단위 : 200g x 40EA, 500g x 20EA
- 작용기작 : 마3+다3



▲ 고추 탄저병

- 탄저병에 강한 트리플록시스트로빈
탄저병 치료는 물론 내우성이 강해 예방에도 효과적입니다.
- EU에서 인정한 약효와 안전성을 갖춘 이프로디온
잣빛곰팡이병 등 채소병해는 물론, 점무늬낙엽병, 잣빛무늬병 등 과수 병해에 상승효과를 보입니다.
- 인축 및 환경에 안전한 약제입니다.

적용병해 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감귤	검은점무늬병	6월상순부터 2주 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전까지	3회 이내
	더듬이병	춘지발생초 15일 간격 경엽처리			
	잣빛곰팡이병	발병초 10일 간격 경엽처리			
고추 (단고추류 포함)	탄저병			수확 2일 전까지	
	흰가루병				
대추	탄저병	수확 14일 전까지			
매실	검은별무늬병	4월중순부터 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전까지	4회 이내
	잣빛곰팡이병	발병초 10일 간격 경엽처리			
	탄저병				
배	검은별무늬병	발병초 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전까지	
	붉은별무늬병				
복숭아	잣빛무늬병	발병초 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전까지		
	탄저병	6월상순부터 10일 간격 경엽처리			
	갈색무늬병				
사과	검무늬씩음병	발병초 10일 간격 경엽처리	수확 21일 전까지	3회 이내	
	점무늬낙엽병	발병초 10일 간격 경엽처리			
	탄저병	6월상순부터 10일 간격 경엽처리			
인삼	점무늬병	발병초 10일 간격 경엽처리	20g(1ℓ/㎡)	-	-
잔디	갈색잎마름병	발병초 7일 간격 토양관주처리	20g	-	-
	동전마름병	발병초 10일 간격 경엽처리	20g(1ℓ/㎡)	-	-
	라이족토니아마름병	발병초 7일 간격 토양관주처리	-	-	-
포도	갈색무늬병	발병초 10일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전까지	4회 이내
	새눈무늬병	발병초 7일 간격 경엽처리			
	잣빛곰팡이병				
	탄저병	발병초 10일 간격 경엽처리			