

저항성 잡초에도
효과가 우수한 중기제초제

논지기

입 제

논지기

수도용
제초제

- 품목명 : 벤조비사이클론 - 0.7%,
프로피리설프론 - 0.25%
- 약효보증기간 : 4년
- 독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급
- 포장단위 : 3kg x 8EA
- 작용기작 : A+B+K3

- 저항성 물달개비, 올챙이고랭이에 효과적인 벤조비사이클론과 피를 포함한 일·다년생 광엽 및 사초과 잡초에 전반적으로 효과가 우수한 프로피리설프론이 함유된 토양처리 제초제
- 토양표면에 강하게 흡착하여 약제 처리층을 형성함으로써 안정적인 효과 발휘

적용잡초 및 사용량

작물명	적용잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생 잡초(올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	이앙 후 10~12일 수면처리	3kg

효과적인 사용방법

- 기계이앙의 경우, 쓰레질 작업을 균일하게 하고 쓰레질 후 2~3일경 모를 2~3cm 깊이로 이앙한 후 논물을 3~4cm 정도로 대고, 이앙 후 10~12일(쓰레질 후 12~14일) 이내에 논 전면에서 골고루 뿌려주십시오.
- 쓰레질 후 이앙시기가 늦어지거나 올방개, 벼풀 등 난방제 잡초가 많은 논에는 먼저, 쓰레질 후 이앙 전 처리제를 살포하시고, 이앙 전 처리제 사용 후 15일경에 이 약제를 처리하십시오.
- 약을 뿌린 후 최소한 3~4일간은 논물이 마르지 않도록 논물관리를 철저히 해주십시오.
- 전년도에 저항성 잡초의 발생이 많았던 논에는 반드시 쓰레질 후 바로 이앙 전 처리제를 살포하여 체계처리 하십시오.
- 저항성 잡초의 적절한 방제시기를 놓친 경우에는 경엽처리용 제초제를 사용하여 주십시오.
- 기계이앙 후 모를 보식할 경우에는 먼저 모를 깊게 심은 후 보식한 모가 활착한 다음 약제를 처리하여 주십시오.
- 물에 희석하지 마시고 사용방법에 따라 사용하십시오.

주의사항

- 찰벼와 흑미 계통 또는 통일계 품종에 사용할 경우, 약해가 발생할 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.