

혼용가능 약제

작물명	구분	혼용가능 약제명
고추	기타제	☆케어스(유타)
	살균제	☆가스란(수) ☆고추탄(수) ☆메가폰(입상) ☆솔루션(액상) ☆시위내(유) ☆일품(수)
	살충제	☆뚝소리(입수용) ☆스트레이트(입상) ☆주움(액상)
고추 (단고추류 포함)	살균제	☆살림꾼(액상) ☆캐스팅(액상) 메카니(유현) 벨리스플러스(입상) 실바코(수) 에이플(입상) 프로키온(액상)
	살충제	모벤토(액상) 모스피란(수) 팬텀(입상)
배추	기타제	☆케어스(유타)
	살균제	☆가스가민(액) ☆가스란(수) ☆고추탄(수) ☆메가폰(입상) ☆빈나리(수) ☆솔루션(액상) ☆일품(수) ☆캐스팅(액상) ☆클립톤(액상) ☆포름(수) 미리카트(액상) 아그렙토(수) 프로키온(액상)
	살충제	☆뚝소리(입수용) ☆스트레이트(입상) 모벤토(액상) 트랜스폼(액상) 팬텀(입상)
수박	기타제	☆케어스(유타)
	살균제	☆고추탄(수) ☆베푸란(액) ☆블루오션(액상) ☆살림꾼(액상) ☆솔루션(액상) ☆시위내(유) ☆일품(수) ☆차트라(입상) ☆찬찬(입상) ☆참조네(수) ☆캐스팅(액상)
	살충제	☆다니톨(유) ☆뚝소리(입수용) ☆슈퍼펀치(액상) ☆스트레이트(입상) ☆엑셀트(액상) ☆유평피아(액상) ☆주움(액상) ☆파워샷(액상) ☆파워샷골드(분액)
수박 (복수박류 포함)	살균제	☆캐스팅(액상) 메카니(유현) 벨리스플러스(입상) 벨쿠트(수) 실바코(수) 푸르겐(유) 프로키온(액상)
	살충제	모벤토(액상) 모스피란(수) 팬텀(입상)
오이	기타제	☆케어스(유타)
	살균제	☆가스란(수) ☆깨고탄(수) ☆디펜더(수) ☆블루오션(액상) ☆시위내(유) ☆신세대(액상) ☆차트라(입상) ☆캐스팅(액상) 벨리스플러스(입상) 벨쿠트(수) 스트로비(액상) 에이플(입상) 푸르겐(유) 프로키온(액상)
	살충제	☆뚝소리(입수용) ☆슈퍼펀치(액상) ☆스트레이트(입상) ☆신기루(유) 모벤토(액상) 모스피란(수) 팬텀(입상)
	영양제	☆칼하드F
쪽파	살균제	☆살림꾼(액상) 명작(액상) 미리카트(액상) 벨리스플러스(입상) 실바코(수) 에이플(입상) 푸르겐(유) 프로키온(액상)
	살충제	세베로(유) 올스타(유)
참외	살균제	미리카트(액상) 오티바(액상) 칸투스(입상) 파리스드(액상) 프로키온(액상)
	살충제	라이몬(액상) 모벤토(액상) 모스피란(수) 트랜스폼(액상) 팬텀(입상)
토마토 (방울토마토 포함)	살균제	☆클립톤(액상) 명작(액상) 미리카트(액상) 벨쿠트(수) 파리스드(액상)
	살충제	라이몬(액상) 모스피란(수) 칼립소(액상) 트랜스폼(액상) 팬텀(입상)
파	살균제	☆살림꾼(액상) 명작(액상) 미리카트(액상) 벨리스플러스(입상) 실바코(수) 에이플(입상) 푸르겐(유) 프로키온(액상)
	살충제	세베로(유) 올스타(유)
호박	살균제	☆보트리사이드(액상) ☆블루오션(액상) ☆시위내(유) 바이코(수) 벤레이트(수) 비반도(액상) 오티바(액상) 올스타(유) 푸르겐(유) 프로키온(액상)
	살충제	☆엑셀트(액상) ☆파워샷(액상) 산마루(수) 팡파레(입상) 팬텀(입상)
	기타제	☆칼슘라겐 ☆칼슘라겐플러스 ☆칼하드F



총재·나방 전문약제

라이징

유제





라이징

- 품목명 및 함량 : 플루사메타마이드 + 메타플루미존 유제 (4+3) %
- 독성 : 저독성, 어독성 I 급 ● 포장단위 : 200ml, 500ml ● 작용기작 : 30+22b

플루사메타마이드

GABA 수용체에 결합하여 구조변형 유도 / Cl- 이온 차단 / 자극억제신호 방해
 ▶ 비정상적인 신경전달로 인한 경련 및 마비

메타플루미존

나트륨 채널을 차단하여 살충작용
 ▶ 곤충 신경 작용으로 경련

방제

모든 총채벌레에 탁월한 효과
담배나방, 파밤나방, 굴파리 효과 우수

효과 발현


약제 처리 1시간 이후 부터 효과 발현
비정상적인 활동을 하며 치사

안전성

꿀벌 : 약제 처리 후 1일 후 방사가 가능
수확 2일 전 사용 가능 : 고추, 오이, 참외, 호박

적용해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용시기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용 기준				
				시기	횟수			
고추 (단고추류 포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리	20ml	수확 2일 전	3회 이내			
	대만총채벌레							
	담배나방							
배추	배추좀나방	다발생기 경엽처리		수확 14일 전				
	파밤나방							
수박 (복수박 포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리		20ml	수확 2일 전	2회 이내		
	목화바둑명나방							
	아메리카잎굴파리							
오이	오이총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리			수확 2일 전			
	오이총채벌레							
참외	목화바둑명나방	다발생기 경엽처리	20ml		수확 3일 전			
토마토 (방울토마토 포함)	아메리카잎굴파리	발생초기 7일 간격 경엽처리					수확 3일 전	
	아메리카잎굴파리							
파 (쪽파 포함)	파굴파리	유충발생초기 10일 간격 경엽처리			수확 14일 전	3회 이내		
	파밤나방	발생초기 10일 간격 경엽처리						
호박 (단호박 포함)	꽃노랑총채벌레	발생초기 7일 간격 경엽처리		수확 2일 전	2회 이내			



라이징 유제의 안전성

꿀벌 안전방사 기준

▶ 약제 처리 후 1일

연속 수확작물 수확 2일 전 사용가능

▶ 수확 2일 전 - 고추, 오이, 참외, 호박

* 참고 사항 : 엑시렐유탁제 관수 후 사용하시면 살충효과를 높일 수 있습니다.