

임페리얼

원예용

살균제

과립훈연제

- 품목명 : 프로사이미돈 - 18%, 디에토펜카브 - 12%
- 약효보증기간 : 4년
- 독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급
- 포장단위 : 40g x 100EA
- 작용기작 : 마3+나2



▲ 딸기 잣빛곰팡이병

- 기존 임페리얼 수화제의 장점은 그대로 유지하면서, 작업자가 농약에 노출 가능성이 적어 중독의 염려가 없는 안전한 농약입니다.
- 수확물에 대한 약흔이 전혀 없어 상품성을 높일 수 있으며 사용이 간편한 생력화 제품입니다.

적용병해 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
딸기	잣빛곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 훈연처리	120g	수확 2일 전까지 사용	3회 이내

주의사항

- 정식 직후나 유묘기, 연약한 묘에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- 지나친 과습 시에는 약해 발생의 우려가 있으므로 관수 직후 또는 작물이 젖어 있을 때나 하우스 내에 안개가 자욱히 끼어 있을 때는 사용하지 마십시오.
- 훈연 시 곧바로 분출되는 짙은 연기가 식물체에 직접 닿을 경우 약해의 우려가 있으므로 약제와 작물체와의 거리를 50cm 이상 간격을 띄우시고 과립훈연제의 열기에 의하여 비닐하우스가 손상될 우려가 있으므로 충분한 간격을 유지하여 설치하십시오.
- 바람이 강하게 부는 날은 약 성분이 한쪽으로 몰려 약효저하 또는 약해의 우려가 있습니다.
- 훈연 작업 시에는 마스크, 고무장갑 등을 착용하여야 하며 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
- 약제를 훈연하기 전에 과립훈연제를 놓은 주변에 인화성 물질을 모두 제거하십시오.
- 훈연 중에는 하우스 내 출입을 금하여야 하며, 훈연이 끝난 후에는 밀폐된 하우스를 충분히 환기시킨 후 농작업을 실시하십시오.
- 신체에 이상이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
- 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
- 연소성이 있기 때문에 화기나 직사광선을 피해야 하며, 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

*화재의 위험이 있으니, 반드시 동봉된 심지를 이용하여 점화하시기 바랍니다.

훈연제의 점화 방법

- 자사의 훈연제에는 점화용 심지가 예비심지를 포함하여 한칸에 두개씩 포함되어 있음.
- 훈연제의 사용에 있어서 점화를 할 시에는 반드시 점화용 심지 한 개만 사용하시고, 예비 심지는 점화되는 칸 주위에서 완전히 제거 하여 주시기 바랍니다.
- 또한 훈연제 점화시에는 점화되는 칸 주위에 인화성 물질이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

[올바른 사용방법]



▶ 심지 및 제품이 수분에 취약하므로 개봉 후 바로 사용하십시오.