


## 사용 방법



논둑을 따라 돌면서 4~5m에 하나씩 투척, 한번은 3~4m, 다음은 7~8m 순으로 번갈아 가며 논 안쪽으로 던집니다.  
(논 폭이 30m 이상 될 경우 중간중간 10m 이상 던져서 고르게 떨어질 수 있도록 합니다.)

논잡초 방제제에  
핵심/한 번지기 한판



## 수도용 제초제

# 한판

직접살포정제



# Benzobicyclon


저항성 잡초에 우수한 효과를 가지며  
백화유도 및 갈변고사 효과

# Proprysulfuron

피, 다년생 사초과(올방개,  
새섬매자기)에 우수한 효과

● 품목명 및 함량 : Benzobicyclon  
+ Proprysulfuron (5+2)%

- 독성 : 저독성 농약
- 약효보증기간 : 4년
- 포장단위 : 300g
- 작용기작 : H27+H02



▶ 투척 후 5분간 수중 발포 후 떠올라 수면 확산이 일어납니다.  
약 10분 정도면 모든 발포 확산이 마무리됩니다. (수온에 따라 시간은 다소 차이가 날 수 있음)

## 적용대상 및 사용량

작물명	적용잡초	사용적기 및 방법	1,000m <sup>2</sup> (10a) 당 사용량
벼 (어린모)	일년생 잡초(피, 물달개비, 여뀌바늘, 밭뚝외풀, 알방동사니, 미국가막사리) 및 다년생 잡초(벗풀, 올방개, 올챙이고랭이)	이앙 후 10~12일	300g/10a

논밭초 양제제에  
핵심한 단지기 한판

## 우수한 효과!

일·다년생 잡초와 난방제 잡초까지 효과 우수

## 간편한 사용!

직접살포정제로 수면과 수중에서 발포, 확산하여 간편하게 던지는 것만으로 잡초방제 끝

## 뛰어난 확산!

뛰어난 확산력으로 10a에 20정으로 잡초방제 가능

### 한판의 우수한 효과



무처리



한판

### 효과 검증



경기 용인 (처리 후 37일)



충남 청양 (처리 후 35일)



전북 부안 (처리 후 31일)

\* 전국 20개 시군 25개 포장에서 농가가 직접 입증한 효과