

대
몽

대 몽

원예용
살균제

입상수화제

- **강력한 치료효과와 안정적인 예방효과가 동시에**
메트코나졸과 카바메이트계 보호살균제인 티오파네이트메틸의 합제로 우수한 방제 효과를 보입니다.
- **과수 주요 병해에 고른 효과**
대몽 입상수화제는 향균 스펙트럼이 넓어 자낭균류, 담자균류, 불완전균류 등에 높은 향균활성을 보입니다.
- **뛰어난 약효 지속성과 내구성**
약효지속성이 우수하고 내우성이 뛰어나 안정된 효과를 발휘합니다.

적용병해 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	20g	수확 14일 전까지 사용	4회 이내
감귤	더듬이병	춘지 발생 초 15일 간격 경엽처리		수확 21일 전까지 사용	3회 이내
복숭아	잣빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
배	검은별무늬병			수확 14일 전까지 사용	5회 이내
	붉은별무늬병				
사과	갈색무늬병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리			
	검무늬썩음병				
파(쪽파 포함)	탄저병			정식 전 토양분무처리	정식 전까지 사용
	흑색썩음균핵병				
포도	새눈무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
마늘	잎마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리	20g(1ℓ/㎡)	파종 전까지 사용	1회 이내
	흑색썩음균핵병	파종 전 토양분무처리			

- 품목명 : 메트코나졸 - 6%,
티오파네이트메틸 - 50%
- 약효보증기간 : 4년
- 독성 : 저독성, 어독성Ⅲ급
- 포장단위 : 500g x 20EA
- 작용기작 : 사+나+1

효과적인 사용방법

- 과수의 다양한 병해에 우수한 효과를 보이므로 초기병해 방제에 사용하시면 지속적인 예방효과를 보실 수 있습니다.

주의사항

- 이 농약을 중복살포 할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복살포를 하지 마십시오.