

우수한 수효성과
강력한 살충력

신파마치온

유제

신파마치온
원예용
살충제

- 합성피레스로이드계인 에스펜발러레이트와 유기인계인 페니트로티온의 혼합제
- 신파마치온 유제는 접촉독 및 소화중독에 의하여 살충 효과
- 내광, 내우성이 높으므로 우수한 잔효성
- 해충을 직접 죽이는데 필요한 약량에 비하여 대단히 적은 양으로도 섭식저해, 산란억제, 기생저해 등의 현상
- 저온에서 활성이 높은 에스펜발러레이트와 고온에서 활성이 높은 페니트로티온의 혼합제이므로 온도에 영향없이 살충력을 발휘

적용해충 및 사용량

작물명	적용해충	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
장미	진딧물(짚레수염진딧물)	발생 초기 경엽처리	20mℓ	-	-
고추 (단고추류 포함)	진딧물(목화진딧물, 복숭아혹진딧물)			수확 3일 전까지 사용	3회 이내
거베라	꽃노랑총채벌레			-	-
감귤	조팝나무진딧물			수확 14일 전까지 사용	3회 이내
배				수확 30일 전까지 사용	

- 품목명 : 에스펜발러레이트 - 1.25%, 페니트로티온 - 15%
- 약효보증기간 : 3년
- 독성 : 보통독성, 어독성 I 급
- 포장단위 : 500mℓ x 20EA
- 작용기작 : 3a+1b

주의사항

- 이 농약은 십자화과 작물에 약해 우려가 있으니 약액이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 이 농약은 중복 살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복 살포를 하지 마십시오.
- 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
- 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.
- 이 농약은 자동차, 벽 등의 도장 면, 대리석, 화강암에 살포액이 묻으면 변색할 우려가 있으므로 살포액이 묻지 않도록 주의하십시오.

취급제한기준

- 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 사용하지 마십시오.