

일등탄

일등탄

원예용
살균제

액상수화제



- 품목명 : 메트코나졸 - 8%, 피라클로스트로빈 - 9%
- 약효보증기간 : 4년
- 독성 : 보통독성, 어독성 | 급
- 포장단위 : 100mL x 100EA
250mL x 40EA
- 작용기작 : 사1+다3

- 과수 주요병해에 강력한 방제효과
트리아졸계, 스트로빌루린계의 혼합제로서 상승효과를 나타내어 내성 병원균에도 우수한 방제효과 발휘
- 빠른 효과
약제 살포 후 수초 내에 병원균 활동을 억제하므로 병 진전이 확연하게 저지됨
- 우수한 내우성과 긴 약효지속기간!

적용병해 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ 당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	동근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 21일 전까지	3회 이내
	탄저병	발병초 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전까지	2회 이내
고추(단고추류 포함)	검은별무늬병	4월중순부터 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 14일 전까지	
		발병초 10일 간격 경엽처리			
매실	갈색무늬병	발병초 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 21일 전까지	
	겹무늬썩음병	6월상순부터 10일 간격 경엽처리			
배	점무늬낙엽병	발병초 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 14일 전까지	
	탄저병	6월상순부터 10일 간격 경엽처리			
복숭아	잿빛무늬병	발병초 7일 간격 경엽처리	10mL	수확 21일 전까지	
사과	갈색무늬병	발병초 10일 간격 경엽처리	10mL	수확 14일 전까지	
	겹무늬썩음병	6월상순부터 10일 간격 경엽처리			
양파	점무늬낙엽병	발병초 10일 간격 경엽처리	10mL(150ℓ/10a)	수확 21일 전까지	
	탄저병	6월상순부터 10일 간격 경엽처리			
인삼	노균병	발병초 7일 간격 경엽처리	10mL	수확 14일 전까지	
	흑색썩음균핵병	월동 후 10일 간격 경엽처리			
파(쪽파 포함)	점무늬병		10mL	수확 50일 전까지	
	탄저병	발병초 10일 간격 경엽처리			
포도	녹병		10mL	수확 14일 전까지	
	잿빛곰팡이병	발병초 7일 간격 경엽처리			
포도	탄저병	발병초 10일 간격 경엽처리			

작용기작

트리아졸계
메트코나졸

+

스트로빌루린계
피라클로스트로빈

강력한 예방/치료 효과
[치료 효과 > 예방 효과]

뛰어난 약효 발현
넓은 항균 스펙트럼

[병원균 생육시기]

