

편리하고 확실하게
논 잡초방제 끝

강사네

액상수화제



- ▶ 새로운 액상제형으로 처리시 빠르고 넓게 확산되어 안정적으로 약효를 발휘
- ▶ 저온성 잡초 및 일·다년생 잡초에 우수하다.
- ▶ 이프펜카바존 합제로 피에 대한 살초, 발생억제 효과를 발휘하며 지속기간이 매우 길다.

품목명 : 이프펜카바존 + 벤조비사이클론 + 이마조선틸론 (5+4+1.5) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III급 | 포장단위 : 500ml x 20EA | 작용기작 : F2+B+K3

적용 잡초 및 사용량

| 작물명 | 적용 잡초 | 사용시기 및 방법 | 1,000㎡ (10a) 당 사용약량 |
|----------------|---|--------------------------|------------------------|
| 기계이앙벼 (어린모) | 일년생 잡초 (피, 물달개비, 가막사리, 여뀌바늘, 알방동사니) 및 다년생 잡초 (올방개, 벼풀, 올챙이고랭이) | 이앙 후 10~12일 원액 수면점적처리 | 500ml |


효과적인 사용방법

- ▶ 기계이앙의 경우, 쓰레질 작업을 균일하게 하고, 쓰레질 후 2~3일경 모를 2~3cm 깊이로 이앙한 후 논물을 3~4cm 정도로 대고, 이앙 후 10~12일(쓰레질 후 12~14일) 이내에 논 전면에 골고루 뿌려 주십시오.
- ▶ 쓰레질 후 이앙시기가 늦어지거나 저항성잡초, 올방개, 벼풀 등 난방제 잡초가 많은 논에는 먼저, 쓰레질 후 이앙 전 처리제를 살포 하시고, 이앙 전 처리제 사용 후 15일경에 이 약제를 처리하십시오.
- ▶ 약을 뿌린 후 최소한 3~4일간은 논물이 마르지 않도록 논물관리를 철저히 해 주십시오.



수도용
제초제

45 | 강사네 액상수화제



▲ 6월 9일 : 이앙 12일 후 처리 20일차 (전남 보성)



▲ 5월 18일 : 이앙 11일 후 처리 22일차 (충남 서천)



▲ 강사네

▲ 기존 액상수화제



▲ 강사네

▲ 기존 액상수화제

주의사항

- ▶ 찰벼와 흑미 계통 또는 통일계 품종에 사용할 경우, 약해가 발생할 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.