

고추탄



수화제

- ▶ 항생제 계통인 가스가마이신과 카바메이트 계통인 카벤다짐의 이상적인 혼합으로 내성균 출현이 적으며, 경엽 살포용으로 포자 발아, 발아관 신장, 부착기 형성, 균사침입 등을 저해하므로 우수한 예방 및 치료 효과
- ▶ 침투성이 강하여 우천 시 비가 멈춘 틈을 이용하여 살포함으로써 적기 방제가 가능
- ▶ 곰팡이병(탄저병 등) 및 세균병(무름병) 동시방제 가능

품목명: 카벤다짐+가스가마이신 (40+3.45%) | 약효보증기간: 3년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 200g x 80EA, 500g x 40EA | 작용기작: 나1+라3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용기준	
				시기	횟수
고추(단고추류 포함)	탄저병	발병 초부터 10일 간격 경엽처리	20g	수확 5일 전	3회 이내
배추	무름병	발병직전부터 7일 간격 경엽처리		수확 10일 전	4회 이내
수박	탄저병	발병 초부터 10일간격 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내
잔디				-	-
토마토	잎곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 경엽처리		수확 2일 전	3회 이내

효과적인 사용방법

- ▶ 장마철에는 비가 멈춘 틈을 타서 약을 뿌려 방제 시기를 놓치지 않도록 하십시오.

주의사항

- ▶ 이 농약은 알칼리성 약제와 섞어 쓰지 마십시오.
- ▶ 이 농약을 중복 살포할 경우 약해의 우려가 있으므로 중복 살포를 하지 마십시오.

대상 병해



▶ 토마토 잎곰팡이병



▶ 토마토 잎곰팡이병



원예용
살균제