

굳타임



수화제

▣ 과수의 주요병해를 방제하는 종합살균제

갈색무늬병, 겹무늬병, 탄저병 등 주요병해에 우수한 효과

▣ 사과 과심곰팡이병 방제

서로 다른 2가지 성분으로 최근 방제가 어려운 사과 과심곰팡이병에도 효과적으로 방제

▣ 예방과 치료효과를 겸비

품목명: 티오파네이트메틸 + 트리플루미졸 (45+15%) | 약효보증기간: 3년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 100g×100EA, 250g×50EA, 500g×20EA | 작용기작: 나1+사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감(단감 포함)	동근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	20g	수확 7일 전	5회 이내
감귤	더뎅이병	춘지 발생시 15일 간격 경엽처리			
결명자	점무늬병	파종 전 24시간 침지처리	40g	파종기	1회 이내
고추(단고추류 포함)	탄저병	발병 초기부터 10일 간격 경엽처리			
배	잿빛곰팡이병	발병 초기부터 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	
붉은별무늬병	발병 초기부터 10일 간격 경엽처리				5회 이내
뽕나무	검은별무늬병	신초발생 초기부터 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	
오디균핵병	개엽기부터(개화 전 5일, 개화 후 5일(낙화직후)) 경엽처리		20g		2회 이내
과심곰팡이병	개화직전 및 낙화직후 경엽처리				
갈색무늬병	발병 초기부터 10일 간격 경엽처리				
사과	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	4회 이내
겹무늬썩음병					
검은별무늬병	개화직전 및 낙화직후부터 10일 간격 경엽처리				
수박	덩굴마름병	발병 초기부터 10일 간격 경엽처리		수확 2일 전	5회 이내
수수	종자소독	파종 전 24시간 침지처리	100g	파종기	1회 이내
장미	흰가루병	발병 초기부터 7일 간격 경엽처리			
참외				수확 3일 전	5회 이내
콩	점무늬병	발병 초기부터 10일 간격 경엽처리			
자주무늬병	발병 초기 10일 간격 경엽처리		20g	수확 20일 전	3회 이내
토마토	잎곰팡이병	발병 초기부터 7일 간격 경엽처리			
파	녹병	발병 초기 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	5회 이내
팥	갈색무늬병	발병 초기 경엽처리			
포도	탄저병	발병 초기부터 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
황기	종자소독	파종 전 12시간 침지처리	50g	파종기	1회 이내

주의사항

▣ 사과에 사용할 경우에는 보르도액, 무기동제와 혼용을 피하십시오.

원예용
살균제