

균핵탄



입제

- ▶ **편하게 살포하는 흑색썩음균핵병 전문약**
입제를 종구파종전 1회 살포함으로써 흑색썩음균핵병 방제가 가능하므로 편리합니다.
- ▶ **메트코나졸의 강력한 세포막 생합성 저해 효과**
메트코나졸은 포자발아, 균사신장, 부착기형성, 균사의 조직내 침입을 방해하여 흑색썩음균핵병균을 강력히 억제합니다.
- ▶ **뛰어난 약효 지속성**
약효지속성이 우수하여 한번 살포로 안정적인 효과를 보입니다.

품목명 : 메트코나졸 (0.75)% | 약효보증기간 : 3년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 3kg x 8EA | 작용기작 : 사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량	안전사용 기준			
				시기	횟수		
고구마	균핵병	종서파종 전 토양혼화처리	6kg	파종정식기	1회 이내		
당근		파종·정식기 토양처리					
망종	흰비단병	파종(정식) 전 토양처리		파종(정식)기			
마늘	흑색썩음균핵병	종구 파종직전 토양혼화처리		파종기			
순무양배추(콜라비)	균핵병	파종(정식) 전 토양혼화처리		파종정식기			
양파	흑색썩음균핵병	정식 전 토양혼화처리		정식기			
우엉	균핵병	파종(정식) 전 토양처리		파종(정식)기			
잔디	동전마름병	발병 초 10일 간격 토양처리		-		-	
쪽파	흑색썩음균핵병	정식 전 토양처리		6kg		정식기	1회 이내
파							
향미나리(파슬리)	균핵병	정식(파종)기 토양처리		정식(파종)기			

방제효과 시험



효과적인 사용방법

- ▶ 마늘 종구파종 직전에 골고루 살포 후 종구를 파종하십시오.
- ▶ 양파 정식 전에 골고루 살포 후 정식하십시오.