

# 노네존



## 입제

- ▶ 이앙동시 처리 및 이앙 10일~12일까지 사용이 가능하여 처리시기의 폭이 넓습니다.
- ▶ 저항성잡초 보강제인 브로모부타이드를 추가하여 효과 탁월
- ▶ 3kg 입제타입으로 논에 골고루 뿌려져 안정적인 효과를 발휘
- ▶ 찰벼, 흑미, 인디카 계통의 다수성벼에도 비교적 안전하게 사용할 수 있습니다.

품목명 : 브로모부타이드 + 펜트라자마이드 + 이마조선풀론 (3+1+0.25)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 3kg x 8EA | 작용기작 : Z+K3+B

## 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀) 및 다년생 잡초 (벼풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	이앙 후 10~12일 수면처리	1,000㎡ (10a)당 사용약량
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀) 및 다년생 잡초 (벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	이앙 후 5~7일 수면처리	3kg
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니, 자귀풀) 및 다년생 잡초 (벼풀, 올방개, 올챙이고랭이)	이앙동시 수면처리	1kg
	일년생 잡초 (피, 가막사리, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 알방동사니)		

## 효과적인 사용방법

- ▶ 이앙동시 처리제로 사용할 경우 논바닥의 정지작업을 균일하게 하고 모가 반드시 2cm 이상 깊이로 침기도록 한 다음 이앙기에 부착된 살포기를 이용하여 이앙동시(씨레질 후 2~3일)에 10a당 3kg씩 논 전면에 골고루 살포하십시오.
- ▶ 이앙 후 10~12일 피 2엽기 이내에는 논 전면에 골고루 살포해 주십시오.
- ▶ 지구온난화로 인하여 잡초의 생육이 과거보다 2~3일 빠르므로 방제 가능한 잡초의 엽기를 놓치지 않도록 주의해 주십시오.
- ▶ 잡초의 생육이 빨라 엽기를 놓칠 우려가 있을 때는 이앙 후 7일 경에 약제를 처리해 주십시오.

## 주의사항

- ▶ 제초제의 효과는 물관리가 중요합니다. 살포 후 5일간은 물이 마르지 않도록 3~5cm 깊이로 물을 유지해 주십시오.
- ▶ 저항성 잡초의 발생이 심한 포장은 반드시 이앙전처리제를 체계처리하여 주십시오.
- ▶ 씨레질 후 3일 이상 이앙을 하지 않고 늦어질 경우에도 이앙전처리제를 체계처리하여 일년생 잡초를 방제해 주십시오.

