

논둑에서 간편하게
효과는 우수하게

논둑탄



대립제

- ▶ **논 잡초 방제에 매우 우수하다.**
피 2~2.5엽기 이내, 일·다년생 광엽잡초, 방동사니과, 저항성 잡초(물달개비, 올챙이고랭이)에 우수
- ▶ **찰벼, 흑미, 인디카 계통의 다수성벼에도 비교적 안전하게 사용**
- ▶ **손살포, 동력살포기, 무인헬기 살포가 가능하고 확산성이 우수한 특허제형 제초제**

품목명 : 브로모부타이드 + 이마조선틸루론 + 페녹솔람 (18+1.5+0.48) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 500g x 20EA | 작용기작 : Z+B+B

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생 잡초 (올방개, 올챙이고랭이, 벼풀, 너도방동사니)	이앙 후 10~12일 수면처리	500g
담수직파벼 (표면산파)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 가막사리) 및 다년생 잡초 (올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	파종 후 15일 수면처리	

효과적인 사용방법

- ▶ 손살포 : 2~3 걸음에 한번 씩 논 전체에 골고루 살포해 주십시오.
- ▶ 동력분무기 : 압력을 중간 정도로 설정시 10~15m, 압력을 강하게 설정시 20m 이상 살포가능, 분무구멍의 크기를 작게 설정하여 살포량을 적게 유지하면서 익숙해지면 분무구멍을 조금씩 크게하여 주십시오. 코너를 돌거나 살포를 일시 중지할 경우에는 구멍을 막아 주십시오.



▲ 비료살포



▲ 손살포



▲ 항공살포

사용방법

- ▶ 썬레질 작업을 균일하게 하고, 썬레질 후 2~3일경 모를 2~3cm 깊이로 이앙한 다음 논물을 3~4cm 정도로 대고, 논 전면에서 골고루 뿌려 주십시오.
- ▶ 피에 대한 방제가능시기가 피 발생 전부터 2.5엽기 이내이므로 처리시기를 반드시 지켜주십시오. 피의생육이 빠른 남부 지역에서 는 처리시기를 앞당겨 주십시오.
- ▶ 썬레질 후 이앙시기가 늦어지거나, 물달개비, 올챙이고랭이, 올방개, 벼풀 등 방제하기 어려운 잡초가 많은 논에는 썬레질 후 바로 이앙 전 처리제를 살포하시고, 사용 15일 후에 이약제를 뿌리십시오.
- ▶ 약을 뿌린 후 최소한 3~4일간은 논물이 마르지 않도록 논물관리를 철저히 해 주십시오.

주의사항

- ▶ 바람이 강하게 불 때에는 한쪽으로 약제가 쏠릴 가능성이 있으므로 바람이 불지 않는 시간에 살포해 주십시오.

사용팁

- ▶ 동방아그로 특허 제형으로 멀리 날아갈 수 있는 적당한 굵기와 물위에 떠서 신속히 골고루 퍼져나가는 특수 제형입니다.
- ▶ 살포시 일부 물리는 부분도 약제간의 반발력으로 다시 골고루 퍼집니다.

수도용
제초제

45 | 논둑탄 대립제