

치료 및 예방효과 우수

# 동방바리문



액제

- ▶ 농업용 항생물질로써 발병 후 살포에도 효과가 있으며 이삭팬 후에도 사용
- ▶ 균사에 닿으면 균사의 신장을 억제하여 초기 병반 형성 및 2차 진전을 저해

품목명: 발리다마이신에이 (5%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 500ml x 20EA | 작용기작: 타

## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
벼	잎집무늬마름병	발병 초 (7월 상순)부터 경엽처리	20ml	수확 21일 전	4회 이내
잔디	갈색잎마름병	발병 초 7일 간격 토양관주	20ml (1ℓ / m <sup>2</sup> )	발병 초기	-
딸기	세균모무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20ml	수확 3일 전	3회 이내

## 효과적인 사용방법

### [벼 잎집무늬마름병]

- ▶ 약액이 잎집에 충분히 묻도록 골고루 뿌리십시오.
- ▶ 벼이삭이 팬 후에 병무늬가 윗 잎집으로 번질 때에는 한번 더 약을 뿌리십시오.
- ▶ 출수후 살포할 때는 사용약량을 지켜 벼의 상부에서 충분히 살포하면 약액이 하부의 균사에 닿아 즉시 균사 내부에 흡수되어 방제 효과를 나타냅니다.

### [잔디 갈색잎마름병]

- ▶ 분무기의 노즐을 빼거나 물뿌리개를 사용하여 m<sup>2</sup>당 희석액 1ℓ 를 잔디 전면에 골고루 관주하십시오.

## 주의사항

- ▶ 이 농약은 영하 5도(°C) 이하에서는 얼 우려가 있으므로, 보관장소의 온도가 영하 5도(°C) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.

수도용  
살균제

20 | 동방바리문 액제