

바랭이·비름·쇠비름
발아억제 발잡초약

동방씨마네

수화제



- ▶ **광합성 억제 효과 발휘, 약효 지속기간이 길어 경제적**
기존 약제에 비해 긴 잔효 효과를 가지고, 바랭이, 쇠비름 등 일년생 화본과 및 광엽잡초에 효과
약효지속기간이 길기 때문에 후작으로 다른 작물을 재배할 때는 주의!
- ▶ **토양이동성이 적기 때문에 적용대상 작물에 안전**
약제 처리층이 땅속 수 cm 이내에 형성되기 때문에 깊게 심긴 작물에 안전

품목명: 시마진 (50)% | 약효보증기간: 5년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 200g x 80EA | 작용기작: C1

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
배	일년생 잡초	이미 나온 잡초를 제거한 후 토양처리	200g
뽕나무		3월 하순과 하벌 직후 토양처리	300g
사과		이미 나온 잡초를 제거한 후 토양처리	200g
소나무(묘포)		해빙 직후 토양처리	200~400g
진주조(청예사료)		파종복토 후 3일 이내 토양처리	200g

주의사항

- ▶ 심한 모래땅이나 과습한 토양에서는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 반드시 잡초가 싹트기 전에 뿌려주되 작물의 잎이나 뿌리에 닿지 않도록 뿌려주십시오.
- ▶ 뽕잎이 피어있는 기간에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 농약은 약효지속기간이 길기 때문에 (60일) 후작으로 다른 작물을 재배할 때에는 특히 주의하십시오.
- ▶ 이상기후(이상고온, 이상저온, 과습, 건조 등)에서는 약해를 받거나, 약효가 떨어질 수 있습니다.

원예용
발제초제