

약방의 감초
어디에나 잘 듣는

동방만코지

수화제



- ▶ **광범위 종합 살균제**
다양한 작물에 등록되어 있어 PLS에 적합
- ▶ **저항성균에 우수한 효과**
저항성이 생긴 곰팡이에 효과가 우수
- ▶ **케어스와 혼용 시 상승효과**
고착 기능을 가진 케어스와 혼용 시 좀 더 안정적인 본연의 효과를 100% 발휘

품목명: 만코제브 (75%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 II 급 | 포장단위: 500g x 20EA | 작용기작: 카

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준		
				시기	횟수	
감(단감 포함)	탄저병	6월 중순부터 10일 간격 경엽처리	40g	수확 45일 전	2회 이내	
	등근무늬낙엽병					
감귤	검은점무늬병(흑점병)	발생초기 경엽처리		수확 30일 전	7회 이내	
	녹응애			수확 21일 전	4회 이내	
감자	역병	발병초부터 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내	
구기자	탄저병	발생초기 경엽처리		수확 21일 전		
금감(금귤)	검은점무늬병			발병초부터 10일 간격 경엽처리	수확 35일 전	4회 이내
녹두	갈색무늬병	발생초기 경엽처리			수확 14일 전	3회 이내
땅콩	검은무늬병			발병초기 경엽처리	수확 35일 전	1회 이내
레몬	검은점무늬병	발생초기 경엽처리				수확 7일 전
마(산약)	탄저병			5,6월과 10월에 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전	
배	검은별무늬병					
사과	점무늬낙엽병	꽃이 피기 전 및 꽃이 진 후 10일경부터 10일 간격 경엽처리		33.3g	수확 30일 전	5회 이내
	갈색무늬병					
	검무늬씩음병					
수박	탄저병	발병직전부터 7~10일 간격 경엽처리		40g	수확 5일 전	1회 이내
양파	노균병	발병초기부터 7일 간격 경엽처리		33.3g	수확 7일 전	5회 이내
유자	탄저병	발병초기 10일 간격 경엽처리			수확 35일 전	3회 이내
인삼	점무늬병	발병초부터 10일 간격 경엽처리		40g	수확 45일 전	5회 이내
참깨	잎마름병				수확 7일 전	1회 이내
참다래(키위)	탄저병	발병초기 10일 간격 경엽처리	33.3g	수확 21일 전	3회 이내	
팔	갈색무늬병	발생초기 경엽처리	40g	수확 7일 전		
포도	탄저병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	33.3g	수확 30일 전		
	새눈무늬병	발병초부터 10일 간격 경엽처리	40g			

주의사항

- ▶ 온도와 습도가 매우 높은 조건에서는 저항력이 약한 유묘나 약해가 발생할 우려가 있습니다.
- ▶ 습도가 높거나 고온에서는 주성분의 분해가 심하므로 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- ▶ 알칼리성 약제(석회보르도액, 석회유황합제)와의 혼용 및 1주일 이내의 근접 살포시 약해가 발생할 우려가 있으니 사용하지 마십시오.

효과적인 사용방법

- ▶ 희석할 때 고착제(케어스, 파라핀왁스)를 추가하여 사용하면 약효가 증진됩니다.