



- ▶ 아닐라이드계 살균제인 티아디닐과 트리아졸계 살균제인 펜뷰코나졸, 카바메이트계 살충제인 벤피라카브의 3원 혼합제로, 약효 지속기간이 긴 살균·살충제입니다.
- ▶ 침투이행성이 우수하고 장기간 효과가 지속되는 육묘상 처리제 벼 이양 후 본답의 도열병, 잎집무늬마름병, 흰잎마름병, 애멸구, 벼물바구미 등 주요 병해충을 일시에 예방할 수 있는 약제입니다.

품목명: 펜뷰코나졸 + 티아디닐 + 벤피라카브 (3+6+3.6%) | 약효보증기간: 3년 | 독성: 보통독성, 어독성 II급 | 포장단위: 1kg × 20EA | 작용기작: 사1+차3+1a

적용 병해충 및 사용량

작물명	적용 병해충	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
벼	깨씨무늬병	이양당일 육묘상처리	50g/상자 (1kg/10a)	이양당일	1회 이내
	목도열병				
	세균벼알마름병				
	이삭누룩병				
	잎도열병				
	잎집무늬마름병				
	흰잎마름병				
	벼물바구미				
	벼잎물가파리				
	벼줄기굴파리				

효과적인 사용방법

- ▶ 물에 희석하지 마시고 육묘상자에 약제를 직접 골고루 뿌리십시오.
- ▶ 모에 물기가 묻어있을 경우 잘 털어 주신 후 1,000㎡당 이양하고자 하는 육묘상자 20~30개에 1kg의 약제를 이양 당일 육묘상자에 골고루 살포하시고, 잎에 묻은 약은 가볍게 털어 상토 위에 떨어지게 하십시오.
- ▶ 약제를 처리할 때와 처리한 후에는 모판에 물이 잠기지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 이 약제는 이양 5일 전부터 이양 당일까지 모판에 사용 가능합니다.

주의사항

- ▶ 유묘에 이슬이 맺혀 있을 경우에 사용하면 약해 발생의 우려가 있으므로 이슬을 잘 털어주신 후 사용하십시오.
- ▶ 밀파되거나 불량환경 등으로 인한 연약한 모, 도장한 모, 생육이 불량한 모나 이양적기를 지난 모 등에 사용하거나 이상기온이 계속되어 뿌리의 생육이나 빠질 경우에는 약해가 발생할 수 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 미숙퇴비를 사용하여 가스장애가 우려되는 논이나 찬물이 나는 논, 염해가 우려되는 간척답에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 병해충의 발생이 평년 이상 대발생할 경우 적용대상 약제를 본답에 추가로 살포하여 주십시오.