

# 동방아그로 초석



## 액상수화제

- ▶ 동방아그로초석은 써레질 직후~이앙2일 전에 사용하는 이앙 전 처리제
- ▶ 이앙 전에 처리함으로써 체계처리를 할 경우, 이앙 후 발생하는 일년생 잡초의 발생 억제
- ▶ 동방아그로초석을 적기에 처리할 경우, 이앙 후 10일경에 일발처리제를 처리하면 더욱 효과증진

품목명: 펜트라자마이드+이마조선폴론 (3+0.75)% | 약효보존기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 400ml x 30EA, 2ℓ x 10EA | 작용기작: K3+B

### 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 발뚝외풀, 미국외풀, 여뀌바늘) (무인항공기)	써레질 직후~이앙2일 전 원액 수면적하처리	400ml
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 알방동사니, 여뀌바늘)		
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 발뚝외풀, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀)	이앙 후 5~7일 원액 수면점적처리	

### 효과적인 사용방법

- ▶ 이 농약은 병에 든 원액을 그대로 사용합니다.
- ▶ 써레질 작업을 균일하게 하여 논 지면을 잘 고른 다음 약을 뿌리시되, 살포시 수심은 3~4cm 깊이로 유지하여 주십시오.
- ▶ 약제살포는 병 밑의 오목한 부분을 손으로 쥐고 살포폭을 10cm 정도로 하여 걸어가면서 5~6보마다 좌우로 한번씩 휘둘러 뿌리십시오.
- ▶ 최소한 이앙 2일 전에는 이 약제를 살포해 주십시오.
- ▶ 이앙 후에는 논물 깊이를 벼의 엽신이 잠기지 않을 정도로 3cm 정도로 하십시오.
- ▶ 분무기를 사용하여 논둑에서 살포하시면 더욱 좋은 효과를 얻을 수 있습니다.

### 처리적기



### 주의사항

- ▶ 모래논, 물빠짐이 심한 논 (물빠짐: 2cm 이상/일), 가스발생담, 침수우려가 있는 논, 염해지에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 병에 걸린 묘, 병해를 받은 묘 또는 생육이 극히 불량한 묘가 이앙될 논에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 논바닥을 고르지 못하여 일부는 논바닥이 보이고 일부는 모가 물에 잠기는 등 물관리가 어려운 논에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 심한 바람이 불 때는 사용을 피하시고 약액이 바람에 날리거나 물의 흐름에 따라 한 곳으로 몰리지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 모내기 후 비가 오거나 물관리의 부주의 등으로 모가 절반이상 물에 잠길 경우에는 약해의 우려가 있으므로 발견 즉시 1~2cm 정도까지 물을 빼어 주십시오.
- ▶ 약제 살포 후 2일간 물을 빼거나 대지 마십시오.