

화분과 및 광엽잡초에  
탁월한 효과

# 동방알라



## 입제

- ▶ **잡초 발생 전 토양처리 발제초제**  
파종복토 후 또는 정식 전에 토양 전면에 골고루 살포. 잡초의 발아 및 초기생육을 억제, 고사
- ▶ **일년생 화분과 및 광엽잡초 방제효과**  
밭에 발생하는 대표잡초(피, 바랭이, 강아지풀, 뚝새풀, 쇠비름, 개비름, 망초 등)에 효과

품목명: 알라클로르 (5%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위: 2kg x 10EA | 작용기작: K3

## 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량
감자	일년생 잡초	직파재배 작물은 씨앗을 덮은 다음 3~4일 이내, 이식재배 작물은 이식직전부터 이식 후 3~4일 이내 토양전면처리	3~5kg
고구마		파종·정식기 토양처리	3kg
동부 비트		정식 후 3일 이내 토양처리	
순무양배추(콜라비)		파종·정식기 토양처리	3~5kg
양파(본포)		직파재배 작물은 씨앗을 덮은 다음 3~4일 이내, 이식재배 작물은 이식직전부터 이식 후 3~4일 이내 토양전면처리	
옥수수		정식 전 토양처리	
참나물(파드득나물 포함)		정식 전 토양처리	3kg
콩		직파재배 작물은 씨앗을 덮은 다음 3~4일 이내, 이식재배 작물은 이식직전부터 이식 후 3~4일 이내 토양전면처리	3~5kg
토란	일년생 및 다년생 잡초	정식 후 3일 이내 토양처리	3kg

## 작용기작

- ▶ 잡초의 뿌리로부터 흡수되어 세포분열 억제로 발아 및 초기생육을 저해하고 고사시키는 역할을 합니다.
- ▶ 화분과 및 광엽잡초에 효과를 발휘합니다.

## 주의사항

- ▶ 작물의 싹이 트는 시기에는 사용을 피하십시오.
- ▶ 사질토나 척박한 땅에서는 약해가 일어날 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 밭에 있어서 토양이 과습한 상태에서는 사용을 피하고 물이 빠진 다음에 사용하되 작물이 싹트는 시기에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 약을 뿌릴 때는 사양토에서 3kg, 양토에서 4kg, 점질토에서 5kg을 넘지 않도록 하십시오.
- ▶ 한발로 인하여 토양이 몹시 건조할 때에는 제형 특성상 약효가 떨어지게 되므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 발아 후 토양 및 기상 조건에 따라 콩에서 축엽현상이 나타나는 경우가 있으나 생육이 진전됨에 따라 본엽 4~5매 내에 완전히 회복되어 생육에는 영향이 없습니다.
- ▶ 이 농약은 인축에 위해한 영향을 줄 수도 있으므로 사용 및 취급에 특히 주의하십시오.

## 효과적인 사용방법

- ▶ **직파재배 작물의 발**  
씨앗을 뿌리고 흙을 곱게 부셔서 씨앗을 덮은 다음 소정량을 토양 전면에서 골고루 뿌리십시오.
- ▶ **이식재배 작물의 발**  
이식 전부터 이식 후 3~4일 이내에 소정량을 토양 전면에서 골고루 뿌리되 이식 후 뿌릴 때는 작물의 줄기와 잎에 묻지 않도록 주의하십시오.

원예용  
발제초제