

잡초 발생 전
토양처리형 제초제

동방트리린



유제

- ▶ **잡초 발생 전 토양처리 발제초제**
파종복토 후 또는 정식 전에 토양 전면에 골고루 살포. 잡초의 발아 및 초기생육을 억제, 고사
- ▶ **토양이동성이 적기 때문에 적용대상 작물에 안전**
약제 처리층이 땅속 수 cm 이내에 형성되기 때문에 깊게 심긴 작물에 안전
- ▶ **일년생 화본과잡초 방제에 효과**
밭에 발생하는 대표적인 화본과잡초(피, 바랭이, 강아지풀, 뚝새풀 등) 발생을 억제, 고사

품목명: 트리플루랄린 (44.5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 II 급 | 포장단위: 300ml x 30EA | 작용기작: K1

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
답리작보리	일년생 잡초	파종복토 후 3~4일 이내 토양전면처리	250ml
배추		파종복토 직후 토양전면처리	200ml
콩			

작용기작

- ▶ 디니트로아닐린계통의 약제로 단백질합성억제 작용으로 세포분열을 교란하여 생육을 억제 고사하게 합니다.
- ▶ 화본과 잡초에 대한 효과가 동일계통보다 우수하고 광엽잡초에 대해서도 효과가 우수합니다.

효과적인 사용방법

- ▶ **답리작 보리밭**
씨앗을 뿌리고 흙을 곱게 부셔서 씨앗을 덮은 다음 3~4일 이내에 10a(1,000㎡)당 소정량의 약을 물 100ℓ 에 타서 토양 전면
골고루 뿌리십시오.
- ▶ **콩·배추밭**
씨앗을 뿌리고 흙을 곱게 부셔서 씨앗을 덮은 다음 바로 10a(1,000㎡)당 소정량의 약을 물 100ℓ 에 타서 골고루 뿌리십시오.

주의사항

- ▶ 심한 모래땅이나 너무 진땅에서는 약해의 우려가 있으니 사용에 주의하십시오.
- ▶ 비닐하우스나 터널 재배시와 같은 밀폐조건에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 약제로 살포한 후 토양이 젖어 있거나 온도가 높아져 약제가 휘산될 경우, 약해의 우려가 있으므로 반드시 토양이 완전히 마른
다음 비닐 피복을 해주십시오.
- ▶ 이 농약은 영하 20도(℃) 이하에서는 얼 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 영하 20도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.

취급제한 기준

- ▶ 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역
에서는 사용하지 마십시오.



원예용
발제초제