

들파내

대립제



- ▶ 찰벼, 유색미에 안전하게
- ▶ 대립제로 사용은 간편하게
- ▶ 올챙이고랭이, 물달개비, 벗풀에 확실하게

품목명: 펜퀴노트리온 + 메페나셋 + 피라조설푸론에틸 (5+25+0.5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 400g x 20EA | 작용기작: F2+K3+B

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000m ² (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 가막사리, 자귀풀, 여뀌바늘, 사마귀풀) 및 다년생 잡초 (벗풀, 올방개, 올챙이고랭이)	이앙 후 10~12일 수면처리	400g

우수한 효과



▲ 강원 고성군 (처리 후 45일)



▲ 경북 상주시 (처리 후 20일)



▲ 전북 김제시 (처리 후 35일)

효과적인 사용방법

- ▶ 피 발생 전 ~ 2.5엽기에 방제하여 주십시오.
- ▶ 피 발생이 빠르거나 우점된 논은 이앙 후 반드시 10일 이내에 사용하십시오.
- ▶ 써레질과 이앙사이의 기간이 길 경우 체계처리를 하십시오.

주의사항

- ▶ 물빠짐이 심한 논이나 척박한 논에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 생벗짚 등 미숙퇴비를 사용하여 가스 발생이 우려되는 논에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 바람이 심하게 부는 경우에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 써레질에서 이앙까지의 기간이 길거나 고온으로 인해 잡초 발생이 빠를 경우 약효가 떨어질 수 있으므로 체계처리 하십시오.
- ▶ 물관리가 되지 않아 바닦이 들어 나거나 벼가 잠기면 약해 우려가 있습니다.
- ▶ 연약모, 천식모, 심식모에는 약해 우려가 있습니다.
- ▶ 논이끼(조류)나 개구리밥의 발생이 많거나 벗짚 등 부유물이 많은 논에서는 약제 확산에 지장을 받아 약효가 떨어질 수 있으므로 제거한 후 사용하십시오.
- ▶ 이상기후(이상고온, 이상저온, 과습, 건조 등)에서는 약해의 우려가 있으니 주의하십시오.
- ▶ 벼밀파육묘재배(일명: 밀묘)로 육묘하여 이앙을 하는 경우에 육묘 특성상 생육억제 등의 약해가 발생할 수도 있으니 사용 시 주의하여 주십시오.

