

빠르고 오래가는
비선택성 제초제

레이저



액상수화제

- ▶ **전천후 광범위 비선택성제초제**
과수원, 비농경지, 논둑, 밭 헛골(고추밭) 등에 발생하는 잡초를 방제
- ▶ **확실한 제초효과**
기존 이행형 제초제에 비해, 잡초의 잎 표면 왁스층을 녹여 약제의 흡수율을 향상시켰기 때문에 보다 확실한 제초효과를 발휘
약제 처리 후, 잡초의 뿌리까지 이행하여 고사시킴
- ▶ **탁월한 안전성**
처리 후, 토양중의 미생물과 햇빛에 의해 빠르게 분해되어 축적될 염려가 없다.

품목명: 플루미옥사진+글리포세이트이소프로필아민 (1.5+28)% | 약효보유기간: 5년 | 독성: 저독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위: 500mL x 20EA | 작용기작: E+G

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
감귤 사과	일년생 및 다년생 잡초	잡초생육기 경엽처리	300mL

효과적인 사용방법

- ▶ 이 농약은 잡초생육기 처리용 제초제이므로 잡초가 충분히 자랐을 때 (20~30cm 정도) 잎과 줄기에 약액이 충분히 묻도록 살포하십시오.
- ▶ 잡초가 50cm 이상 자랐을 경우에는 살포 물량과 약량을 1.5배 정도 증가시켜 주십시오.

주의사항

- ▶ 이 농약은 비선택성 제초제이므로 뿌릴 때에는 농작물의 잎, 어린줄기, 과실, 로터리 작업 후 노출된 뿌리 등에 직접 묻을 경우 심한 피해가 일어나므로 주의하여 사용하십시오.
- ▶ 이 농약을 사용할 경우에는 반드시 비선택성 제초제 전용분무기 및 살포 기구로 사용하시고, 이 농약을 사용한 살포 기구로 다른 농약이나 비료를 절대 사용하지 마십시오.
- ▶ 약액이 작물에 묻을 경우, 심한 피해가 발생하므로 반드시 비산방지캡을 씌우고 약액이 바람에 날리지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 산비탈과 같은 경사지에서는 약액이 날아가서 작물에 피해를 줄 수 있으므로 주의하십시오.
- ▶ 바람이 많은 날에는 약액이 바람에 날아가서 작물에 피해를 줄 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 농약을 뿌린 후 6시간 이내에 비가 오면 약효가 떨어질 수 있으며, 2시간 이내에 심한 비가 내렸을 경우에는 다시 뿌려 주십시오.
- ▶ 이 농약을 뿌릴 때, 흙탕물을 사용하면 제초 효과가 떨어지므로 맑은 물을 사용하십시오.
- ▶ 이 농약을 희석하거나 살포 할 경우, 아연도금을 한 양철용기는 사용하지 마십시오.
- ▶ 사용하기 직전에 용기내의 희석액을 잘 저어서 사용하십시오.
- ▶ 이 농약은 영하 5도(℃) 이하에서 얼 우려가 있으므로 보관장소의 온도가 영하 5도(℃) 이하로 내려가지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 작물이 있는 근처에서는 절대 사용하지 마시고, 이 농약을 사용한 후에는 방제 기구를 반드시 세척하십시오.

원예용
비선택성 제초제