

예방 및 치료 효과가 우수한
과수 종합 살균제

리스펙트



입상수화제

- ▶ 예방 및 치료 효과를 겸비한 종합살균제
탄저병을 비롯한 과수 종합 살균제
- ▶ 침투이행 효과가 있어 내우성이 우수하고 약효 지속 기간이 김
- ▶ 다양한 작용기작으로 저항성 균에도 효과 우수

품목명: 디티아논+메트코나졸 (30+5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위: 500g x 20EA | 작용기작: 카+사1

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감귤	더듬이병	춘지발생 초 15일 간격 경엽처리	20g	수확 7일 전	4회 이내
	검은점무늬병	6월 상순부터 2주 간격 경엽처리			
	젓빛곰팡이병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
고추 (단고추류 포함)	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	13.3g	수확 2일 전	3회 이내
매실	검은별무늬병	4월 중순부터 10일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	4회 이내
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
배	검은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	13.3g	수확 14일 전	4회 이내
	붉은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	3회 이내
	젓빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
사과	점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리	13.3g	수확 14일 전	4회 이내
	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리			
	겹무늬씩음병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리			
포도	탄저병	발병 초 10일 간격 경엽처리	20g	수확 21일 전	3회 이내

리스펙트 입상수화제 특징

- ▶ 넓은 항균활성
 - 사과, 배, 감귤 등 과수의 주요 병해에 높은 활성
 - 복숭아 세균구멍병과 같은 세균 병해에도 효과
- ▶ 보호 효과가 뛰어남
 - 포자 발아를 강하게 저해하여 우수한 보호 효과를 보임
- ▶ 내우성이 뛰어남
 - 내우성이 뛰어나 잔효성이 우수한 약제
- ▶ 내성균 발현 우려가 적은 약제
 - 타약제의 효과가 저하된 지역에서도 안정적 효과

효과적인 사용방법

- ▶ 사용 약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오.

리스펙트 입상수화제 효과

- ▶ 사과 탄저병 (2009, 신젠타코리아 부설연구소)

리스펙트	90.9%
대조약제	83.6%
- ▶ 배 흑성병 (2010, 순천대학교)

리스펙트	80.9%
대조약제	78%

주의사항

- ▶ 사과 품종 중 '홍월', '홍로', '홍옥' 등 일부 품종에 봉지를 씌우지 않은 경우 열매에 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 리스펙트를 사용했거나 사용하고자 하는 작물에는 약해의 우려가 있으므로 파라핀오일 유제를 절대 사용하지 마십시오.



원예용
살균제