

마운드



입제

- ▶ **편하게 사용하는 입제형 잔디 제초제**
1봉(2kg)으로 60평(200㎡ : 가로20mX세로10m 기준) 사용 가능
- ▶ **산소(묘소)에 발생하는 골치 아픈 잡초방제를 손으로 간편하게!**
늦가을부터 이듬해 봄까지 다양한 종류의 잡초를 발생 전에 한 번 처리로 방제한다.
- ▶ **겨울~초봄(11월~이듬해 2월말)까지 1회 방제로 장마 전까지 잡초 걱정 끝!**
토양표면 ~ 땅속 수 cm 이내에 처리층을 형성하여 효과가 오래 지속된다.

품목명: 디클로베닐 (2.65%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 Ⅲ급 | 포장단위: 2kgx10EA | 작용기작: L

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량
한국잔디	일년생 및 다년생 잡초	잡초발생 전(잔디휴면기) 토양처리	10kg

효과적인 사용방법

- ▶ 잡초 발생 전 토양표면을 잘 고른 다음 살포하면 효과적입니다.
- ▶ 잡초가 발아 전 또는 어릴 때(5cm 이하) 사용하면 효과가 우수합니다. 이미 발생한 잡초는 방제효과가 떨어지므로 잡초를 제거한 후 사용하십시오.
- ▶ 토양이 습할 때 사용하면 효과가 좋으므로 눈, 비오기 전, 직후 사용하는 것이 좋습니다.
- ▶ 퇴비, 비료 등 시비작업이 끝난 후 사용하여야 합니다.
- ▶ 토양의 전면적에 처리할 필요가 없는 경우에는 줄처리, 부분처리를 하면 효과적입니다.
- ▶ 한 곳에 집중적으로 떨어지지 않도록 골고루 뿌려 주십시오.

주의사항

- ▶ 심한 강우가 예상되거나 심한 사질토양에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 가뭄이 계속되어 토양이 건조한 경우에는 약효가 떨어지게 되므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 토양과의 혼합처리를 하지 마십시오.
- ▶ 벤트그라스 등 서양잔디(한지형 잔디)에는 약해가 있으므로 절대 사용하지 마십시오.
- ▶ 잔디의 발아초기 및 생육기에는 약해가 나므로 반드시 잔디휴면기(11월~이듬해 2월말)에 사용하여야 합니다.
- ▶ 새로 잔디를 조성한 곳이나 잔디 육묘장 및 잔디의 생육이 불량한 곳에는 사용하지 마십시오.



원예용
잔디제초제