

논제초 이젠 쉽고 편하게

메아리



액상수화제

- ▶ 강력한 효과와 긴 지속기간
- ▶ 피, 벼풀 등 난방제 잡초와 간척지에 발생하는 매자기에 효과적이며 40일 이상 약효 지속
- ▶ 벼 생육초기에 처리해도 안전하다.
- ▶ 토성, 급격한 온도차 등의 조건에서도 안정적인 효과를 발휘합니다.

품목명: 펜트라자마이드 + 이마조선폴론 (6+1.5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 500ml x 20EA | 작용기작: K3+B

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 사마귀풀, 물달개비, 여뀌바늘, 알방동사미) 및 다년생 잡초 (올방개, 너도방동사니, 벼풀, 올챙이고랭이)	이앙 후 15일(씨레질 후 16~18일) 수면점적처리	500ml

효과적인 사용방법

- ▶ 논바닥의 씨레질을 고르게 하고 씨레질 후 2~3일경 모를 2~3cm 깊이로 심은 다음 논물을 5cm 이상 충분히 댄 후, 피 2~2.5엽 기이내(씨레질 후 16~18일 이내)에 병을 흔들어서 원액을 골고루 뿌리십시오.
- ▶ 논 폭이 20m인 경우, 논에 들어가지 않고 논둑을 걸어가면서 3~4걸음마다 1회씩 논 안쪽을 향하여 가능한 한 멀리 휘둘러 주십시오.
- ▶ 논 폭이 30~40m인 경우는 논둑을 돌아가면서 뿌리고 난 후, 논 가운데를 걸어가면서 2걸음마다 좌우로 한 번씩 번갈아 뿌리십시오.
- ▶ 이 약제는 물을 깊이 대어야 약효가 잘 나타나므로 물을 5cm 이상 깊게 댄 후 약제를 살포하시고, 약제를 뿌린 후 최소한 3~4일은 논물이 마르지 않도록 주의하여 주시고 3일 이내에 물이 빠지거나 논물이 마르면 약효가 떨어질 수 있으므로 물관리를 철저히 하여 주십시오.
- ▶ 씨레질 후 이앙시기가 늦어지거나 올방개, 벼풀, 피 등 난방제 잡초가 많은 논에는 씨레질 후 바로 초기확과 같은 이앙전 처리제를 살포하시고 이앙전 처리제 사용후 15~20일경에 이 약제를 뿌리시면 더욱 우수한 효과를 발휘합니다.
- ▶ 전년도에 저항성 잡초의 발생이 많았던 논에는 반드시 씨레질 후 바로 반들, 반석과 같은 이앙전 처리제를 살포하여 체계처리 하십시오.
- ▶ 저항성 잡초의 적절한 방제시기를 놓친 경우에는 경엽처리용 제초제를 사용하여 주십시오.
- ▶ 기계이앙 후 모를 보식할 경우에는 먼저 모를 깊게 심은 후 보식한 모가 활착한 다음 약제를 처리하여 주십시오.

수도용 제초제