

몬스터



입제

- ▶ **흑색썩음균핵병에 우수한 효과**
기존 EBI 계통의 약제에 내성이 생긴 흑색썩음균핵병에 안정적인 효과 발휘
- ▶ **라이족토니아에 의한 토양 병해에 효과 우수**
- ▶ **입제타입으로 사용이 편리**

품목명: 펜사이큐론 (3)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 2kg x 10EA, 3kg x 8EA | 작용기작: 나4

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
고구마	균핵병	종서 파종 전 토양처리	6kg	파종기	1회 이내
고추 (단고추류 포함)	흰비단병	정식 전 토양혼화처리		정식기	
고추 (잎)		정식 (파종) 전 토양혼화처리		파종기	
단호박		정식 전 토양처리		정식기	
달래	흑색썩음균핵병	파종·정식기 토양처리	6kg	파종·정식기	1회 이내
당근	균핵병	파종 (정식) 전 토양처리			
땅콩	흰비단병	파종·정식기 토양처리			
마 (산약)	뿌리썩음병	파종 전 토양혼화처리			
마늘	흑색썩음균핵병	정식 전 토양혼화처리	6kg	파종기	1회 이내
수박 (복수박 포함)	균핵병	정식 전 토양혼화처리		정식기	
순무양배추 (콜라비)		파종 (정식) 전 토양혼화처리		파종·정식기	
양파	흑색썩음균핵병	정식 전 토양혼화처리		정식기	
우엉	균핵병	정식 (파종)기 토양처리	정식 (파종)기		
인삼	잘록병	묘삼정식 전 토양혼화처리	정식기		
파 (쪽파 포함)	흑색썩음균핵병	정식 전 토양혼화처리	6kg	파종·정식기	1회 이내
향미나리 (파슬리)	균핵병	파종·정식기 토양처리		정식기	
호박	흰비단병	정식 전 토양처리		정식기	

효과적인 사용방법

- ▶ 물에 희석하여 사용하지 마시고 사용 약량을 잘 지켜 토양 전면에 잘 살포 한 후 토양과 잘 섞어 주십시오.

마늘 흑색썩음균핵병

