

밧가리



유탁제

- ▶ **잡초 발생 전 토양처리 밧제초제**
클로로아세트아마이드계의 흡수이행형 제초제로, 파종복토 후 또는 정식 전에 토양 전면에 골고루 살포
잡초의 발아 및 초기생육을 억제, 고사
- ▶ **일년생 화본과잡초와 일부 광엽잡초에 대한 방제효과**
잡초 발생 전에 처리해야 함. 발생된 잡초는 제거 후 사용해야 함

품목명 : 메톨라클로르 (30)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 400ml x 20EA | 작용기작 : K3

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
콩	일년생 잡초	파종복토 후 3일 이내 토양처리	3kg
고추		정식전(비닐피복전) 토양처리	250ml
옥수수		파종복토 후 3일 이내 토양처리	400ml
콩			
파		정식 후(잡초발생전) 토양처리	

원예용 밧제초제

효과적인 사용방법

- ▶ 직파재배 작물은 씨앗을 뿌리고 흙을 곱게 부셔서 씨앗을 덮은 다음 소정약량을 골고루 살포하십시오.

주의사항

- ▶ 사용시기 및 사용약량을 반드시 지키시고 심한 모래땅에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 유기물이 적은 척박한 토양이나 사질토 및 과습한 토양에서는 약해 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 살포 후 비가 올 염려가 있을 때에는 약해의 우려가 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 토양이 건조하거나 토양 유기물함량이 높을 경우 또는 점토질이 많은 밭의 경우에는 사용물량을 증가하여 사용하십시오.
- ▶ 잡초가 발생한 후에 사용하면 효과가 떨어지므로 반드시 잡초가 발생하기 전 또는 이미 발생한 잡초를 제거한 후에 뿌리십시오. 단, 쇠비름이 많은 밭에서 경운이나 로터리 후에 뿌릴 때에는 조각난 쇠비름의 방제가 어려우니 주의하십시오.
- ▶ 사용시기와 방법을 꼭 지키고 중복해서 사용할 경우 약해가 날 수 있으므로 주의하여 주십시오.