

강력하고 오래간다
그래서 좋다

베테랑



입제

- ▶ 토양 처리에 특화된 약제
- ▶ 뿌리로부터 이행성이 좋아 정식 시기 토양처리 효과 우수
- ▶ 초기 진딧물 밀도 억제

품목명: 이미다클로프리드 (2) % | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 1kg x 20EA | 작용기작: 4a

적용 해충 및 사용량

작물명	적용 해충	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
감자 갓	복숭아혹진딧물	파종직전 토양혼화처리	3kg	파종기	1회 이내
		파종 전 토양혼화처리			
고추	온실가루이	정식 전 토양혼화처리	3kg	정식기	1회 이내
	진딧물(목화진딧물, 복숭아혹진딧물)				
국화	목화진딧물			-	-
담배	복숭아혹진딧물	정식 전 토양골처리	2kg	정식기	1회 이내
백수오(큰조롱)	큰검정풍뎀이	유충부화기(7월하순) 토양전면처리	3kg	수확 90일 전	
백합	목화진딧물	발생 초 토양파구처리			-
벼(육묘상)	애멸구	어린모이양 전 육묘상자 처리	75g/상자	이양당일	2회 이내
소나무	솔잎혹파리	4월하순~5월하순 유충기 및 용기처리	20g/흉고직경cm	-	-
수박	복숭아혹진딧물	정식직전 파구처리	3g/주	수확 45일 전	2회 이내
	목화진딧물				
참외	목화진딧물	정식 전 토양혼화처리	3kg	정식기	1회 이내
팔	큰검정풍뎀이	파종 전 토양혼화처리		파종 전	

효과적인 사용방법

- ▶ 벼육묘상 처리시에는 이양당일에 소정량의 농약을 육묘상에 균일하게 살포하고 잎에 붙은 약은 잘 털어 주십시오.
- ▶ 수박을 정식할 때는 구덩이를 파고 3g/주를 골고루 뿌린 후 옮겨 심으시고, 감자, 고추는 1,000㎡당 3kg의 사용량을 처리 후 휴과 잘 섞은 다음 파종하여 주십시오.
- ▶ 진딧물: 소정량의 약을 골고루 뿌리고 휴과 잘 섞은 다음 정식하여 주십시오.
- ▶ 솔잎혹파리: 4월하순~5월하순경 솔잎혹파리 유충기 및 용기에 소나무 흉고 직경 1cm당 20g을 소나무 주위에 원형으로 구덩이를 파고 골고루 뿌린 후 완전히 휴과로 덮어 주십시오.
- ▶ 애멸구: 이양당일에 소정량의 농약을 육묘상에 균일하게 살포하고 잎에 붙은 약은 잘 털어 주십시오.

주의사항

- ▶ 꿀벌에 피해가 있으므로 꽃이 피어있는 동안에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 누에에는 장기간 독성이 있으니 뽕나무밭 주위에서는 사용하지 마시고 약제가 누에나 잠구에 묻지 않도록 주의하십시오.

원예용
살충제

179 | 베테랑 입제