

# 부타



## 유제

- ▶ 잡초 발생 전 토양처리 발제초제  
잡초 발생 전에 처리해야 함. 발생된 잡초는 제거 후 사용해야 함
- ▶ 일년생 화본과잡초(피, 바랭이, 뚝새풀) 및 일부 광엽잡초 방제에 효과적
- ▶ 벼(건답 직파), 보리, 밀(답리작 추파) 작물에 특화된 제품

품목명: 부타클로르 (58.8%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위: 300mL x 30EA | 작용기작: K3

## 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
갯 건답 직파벼 밀(답리작 추파)	일년생 잡초	파종복토 후 3일 이내 토양처리	250mL
보리		파종 후 3일 이내 토양처리	
부추		정식기 토양처리	300mL
			250mL

## 작용기작

- ▶ 잡초의 뿌리로부터 흡수되어 세포분열 억제로 발아 및 초기생육을 저해하고 고사시키는 역할을 합니다.
- ▶ 화본과 및 광엽잡초에 효과를 발휘합니다.

## 효과적인 사용방법

- ▶ 보리밭, 답리작추파 밀, 건답직파벼  
파종 후 3일 이내에 소정약량을 물에 희석하여 분무기를 이용하여 토양 전면에 골고루 뿌리십시오.

## 주의사항

- ▶ 토양 수분이 과습한 상태에서는 사용을 피하시고 물이 빠진 다음에 사용하십시오.

## 취급제한 기준

- ▶ 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역에서는 사용하지 마십시오.