

하우스 흰가루병 및
덩굴마름병 방제약제

블루오션



액상수화제

- ▶ **원예용 종합살균제**
각종 원예작물의 흰가루병, 잿빛곰팡이병, 잎곰팡이병 등을 동시에 방제
- ▶ **저항성 곰팡이 방제에 효과적**
서로 다른 2가지 성분을 가지고 있어 저항성 관리에 효과적
- ▶ **강력한 치료효과와 오랜 약효 지속성**

품목명: 플루사피록사드 + 메트라페논 (8+9.1)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 | 급 | 포장단위: 100mL×50EA, 200mL×40EA, 1ℓ×15EA | 작용기작: 다2+나6

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
가지	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전	3회 이내
	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
감(단감 포함)	등근무늬낙엽병	6월 상순부터 10일 간격 경엽처리	8mℓ	수확 21일 전	
갓	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
갓기름나물(방풍) 고들빼기				수확 14일 전	
고추(단고추류 포함)	갈색점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일 전	3회 이내
곤달비 냉이	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
딸기	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내
	흰가루병				
민들레	꽃곰팡이병	개화직전부터 7일 간격 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
		발병 초 경엽처리			
배	붉은별무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	8mℓ	수확 21일 전	3회 이내
	검은별무늬병				
복숭아	잿빛무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	
비트	잿빛곰팡이병	발병 초 경엽처리	10mℓ	수확 7일 전	2회 이내
사과	점무늬낙엽병	발병 초 10일 간격 경엽처리	8mℓ	수확 21일 전	3회 이내
	갈색무늬병				
상추	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
수박(복수박 포함)		발병 초 10일 간격 경엽처리			
	썩 양상추 영경귀	덩굴마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일 전
오이	흰가루병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	2회 이내
		발병 초 10일 간격 경엽처리			
오이	잿빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 5일 전	3회 이내
	정식 전 토양관주처리	40mℓ(150mℓ/주)	정식기	1회 이내	
잔디	라이족토니아마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 5일 전	3회 이내
		동전마름병	발병 초 7일 간격 토양관주처리	6.7mℓ(1ℓ/m ²)	-
		발병 초 10일 간격 경엽처리	6.7mℓ	-	-



원예용
살균제

111 | 블루오션 액상수화제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
잔디	여름잎마름병(썸머패취)	발병 초 관주처리	6.7mℓ(1ℓ/m ²)	잡초발생기	-
참깨	잎마름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 14일전	3회이내
참외	흰가루병			수확 2일전	
토마토(방울토마토 포함)	젓빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10mℓ	수확 3일전	3회이내
	앞곰팡이병				
파	흰가루병	발병 초 경엽처리	8mℓ	수확 14일전	2회이내
포도	젓빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리			
향미나리(파슬리)	흰가루병	발병 초 경엽처리	10mℓ	수확 3일전	3회이내
호박(단호박 포함)		발병 초 10일 간격 경엽처리			

주의사항

- 추천약량 초과 사용 시 엽갈변 등 약해 위험이 있습니다.
- 흰가루병 약제는 다발생기 살포시 내성균 발현이 빠르므로 타 계통 약제(시위내플러스 유제 등)와 번갈아 사용해 주시기 바랍니다.
- 전착제와 혼용시 약해가 발생하므로 혼용하지 마십시오.



원예용
살균제