

# 빙고



## 입제

- ▶ **벼 이앙 전 상자처리로 흰잎마름병, 도열병 및 주요해충 방제**  
이앙 7일 전에서 이앙 당일까지의 기간중 편한시기에 한번 살포로 주요 병충해 방제가 가능합니다.
- ▶ **종합적 병해충 관리에 적합한 약제**  
육묘상처리 특성상 적은 약량으로 본답의 병해충까지 방제 가능하므로, 벼 재배시 살포되는 약제량을 최소화해 환경 및 논생태계에 영향을 최소화 합니다.
- ▶ **벼의 저항성 유도**  
아이소티아닐은 벼의 병해저항성을 유도하여 방제효과가 안정적으로 지속됩니다.
- ▶ **친환경적이고 노동력절감효과가 뛰어난 약제 입니다.**

품목명: 아이소티아닐 + 클로티아니딘 (1+0.5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위: 1kg x 20EA | 작용기작: 차3+4a

### 적용 병해충 및 사용량

작물명	적용 병해충	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
벼	깨씨무늬병	이앙당일 육묘상처리	50g/상자	이앙기	1회 이내
	목도열병				
	잎도열병				
	흰잎마름병				
	벼물바구미				
	벼잎물가파리				
	벼줄기굴파리				
	애멸구	이앙 7일 전 육묘상처리			
	깨씨무늬병	파종시 육묘상처리			
	목도열병				
	세균벼알마름병				
	이삭누룩병				
	잎도열병				
	키다리병				
	흰잎마름병				
	벼물바구미				
	벼잎물가파리				
	벼줄기굴파리				
	애멸구				
	세균벼알마름병				
키다리병	50g/상자				
애멸구					

### 효과적인 사용방법

- ▶ 약제 살포 전에 잎에 묻어있는 이슬이나 물방울을 털어 주십시오.
- ▶ 묘판 상자당 50g씩 골고루 살포해 주십시오.
- ▶ 약제 살포 후 잎에 묻어있는 약제를 털어 주십시오.



수도용  
상자처리제