

살초대첩



입제

- ▶ 피에 대한 확실한 효과(단일성분으로 피 3엽기 까지)
- ▶ 잡초의 잎, 줄기와 뿌리를 통해 신속히 분열조직으로 이동 효과 발휘 체계처리 시 더욱 확실한 효과
- ▶ 이앙 전 처리제나 초기제초제 처리 후, 15일 이내 (잡초발생 전 ~ 피3엽기 이내)

품목명:페녹솔람 (0.12)% | 약효보증기간:3년 | 독성:저독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위:3kg×8EA | 작용기작:B

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (중묘)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 가막사리, 발뚝외풀, 여뀌바늘, 자귀풀, 알방동사니) 및 다년생 잡초 (올방개, 벼풀, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	이앙 후 10~12일 수면처리	3kg

효과적인 사용방법 및 주의사항

- ▶ 이 농약을 사용할 경우, 써레질 후 이앙시기가 늦어져 잡초발생이 많아지거나 피, 올방개, 벼풀 등 난방제 잡초가 많은 논에는 써레질 후 이앙전 처리제를 살포하시고, 이앙전 처리제 사용 후 15~20일경에 이 약제를 뿌리시면 우수한 효과를 발휘합니다.
- ▶ 이앙 전 처리제나 이앙 후 초기제초제를 처리한 후, 피 방제에 실패한 논인 경우, 체계처리하면 효과적으로 방제할 수 있습니다.
- ▶ 전년도에 저항성잡초의 발생이 많았던 논에는 반드시 써레질 후 바로 이앙 전 처리제를 살포하여 체계처리 하십시오.
- ▶ 저항성잡초의 적절한 방제시기를 놓친 경우에는 경엽처리용 제초제를 사용하여 주십시오.
- ▶ 올방개가 많이 발생한 논은 올방개 방제용 전문약제를 사용하십시오.
- ▶ 피 방제시기를 놓친 경우 약량을 (1.5배) 증가하여 사용해 주십시오.