

벗풀 걱정 끝  
올방개 저항성 잡초까지

# 스리백

액상수화제



- ▶ 피, 일·다년생 잡초, 사초과, 저항성 잡초 방제에 우수한 약제입니다.  
잡초의 잎과 줄기, 뿌리로 빠르게 흡수 되며 강한 토양 흡착력을 가지기 때문에 안정적이고 긴 효과
- ▶ 기발생된 저항성 벗풀, 물달개비를 포함한 광엽 잡초에 효과 우수하며  
약효가깁니다.
- ▶ 피방제는 발생 전 2.5엽기 이내에 사용하시면 우수한 효과 발휘

HOT

품목명: 벤조비사이클론 + 플로르피록시펜벤질 + 프로피리슬프론 (3+0.5+1.2)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 500mL x 20EA | 작용기작: F2+미분류+B

## 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000m <sup>2</sup> (10a)당 사용약량
기계이양벼 (여린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌, 자귀풀, 알방동사니, 미국가막사리, 밭뚝외풀) 및 다년생 잡초 (벗풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	이앙 후 10~12일 원액 수면점적처리	500mL



수도용  
제초제

## 우수한 일·다년생 잡초 방제효과

### 일년생 잡초



### 다년생 잡초



## 주의사항

- ▶ 모래논, 물빠짐이 심한 논(물빠짐 : 2cm이상/일), 야산개답지, 유기물 함량이 낮은 척박한 논(새로 개간한 논이나 경지 정리한 논), 찬물이나는 논, 고냉지 등 부적지에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 바람이 심하게 부는 경우에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 농약은 피를 2~2.5엽기까지 방제합니다. 써레질 후 이앙까지 기간이 3일 이상되는 포장이나 써레질 후 고온으로 피의 생장이 빠를 경우에는 피에 대한 효과가 떨어질 수 있으므로 이와 같은 포장에서는 반드시 이앙전 처리제나 일년생제초제와 체계처리 하십시오.
- ▶ 이 농약은 써레질이 잘 되지 않아 논바닥이 논물위로 드러난 논이나, 모가 완전히 물에 잠기는 논에서는 약해가 발생할 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 논이끼(조류)나 개구리밥의 발생이 많거나 벗짚 등 부유물이 많은 논에서는 약제 확산에 지장을 받아 약효가 떨어질 수 있으므로 제거한 후 사용하십시오.
- ▶ 이 제품은 찰벼 및 유색미, 통일계 다수확 품종대상으로 사용할 경우 약해가 발생할 우려가 있으므로 주의하시기 바랍니다.

**스리백 액상수화제 - 강력한 살초력을 확인해보세요.**

벗풀 방제효과 - 경기 이천(6월 5일 : 처리 6월 25일 : 조사)



여뀌 방제효과 - 충북 충주(6월 7일 : 처리 6월 21일 : 조사)



벗풀 방제효과 - 충북 충주(처리 14일 후)



물달개비 방제효과 - 경기 평택(처리 4일 후)



올방개 방제효과 - 경북 의성(처리 33일 후)



수도용  
제초제

58 | 스리백 액상수화제