

그명성 그대로
잿빛곰팡이병 전문약제

스미렉스

과립훈연제



▶ 비가 오는 날, 흐린날 간편하게 사용

시설내 습도가 높아 곰팡이 방제가 어려운 시기에 효과적으로 사용 가능

▶ 인축 독성이 적어 작업자에 안전

수확물에 약흔이 남지 않아 사용에 편리

품목명: 프로사이미돈 (30%) | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 40g × 100EA | 작용기작: 마3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
고추(단고추류 포함)	잿빛곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 훈연처리	120g	수확 2일 전	3회 이내
		개화직전부터 7일 간격 훈연처리		수확 5일 전	
딸기	잿빛곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 훈연처리	120g	-	-
백합	잎마름병	발병 초부터 7일 간격 훈연처리	120g	수확 2일 전	3회 이내
오이	잿빛곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 훈연처리	120g		
토마토	잿빛곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 훈연처리	120g		

주의사항

- 정식 직후나 유묘기, 연약한 묘에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
 - 지나친 과습 시에는 약해 발생의 우려가 있으므로 관수 직후 또는 작물이 젖어 있을 때나 하우스 내에 안개가 자욱히 끼어 있을 때는 사용하지 마십시오.
 - 훈연 시 곧 바로 분출되는 짙은 연기가 식물체에 직접 닿을 경우 약해의 우려가 있으므로 약제와 작물체와의 거리를 50cm 이상 간격을 띠우시고 과립훈연제의 열기에 의하여 비닐하우스가 손상될 우려가 있으므로 충분한 간격을 유지하여 설치하십시오.
 - 바람이 강하게 부는 날은 약 성분이 한쪽으로 몰려 약효저하 또는 약해의 우려가 있습니다.
 - 훈연 작업 시에는 마스크, 고무장갑 등을 착용하여야 하며 작업 후에는 입안을 물로 행구고 손, 발, 얼굴 등을 비누물로 깨끗이 씻으십시오.
 - 약제를 훈연하기 전에 과립훈연제를 놓은 주변에 인화성 물질을 모두 제거하십시오.
 - 훈연 중에는 하우스 내 출입을 금하여야 하며, 훈연이 끝난 후에는 밀폐된 하우스를 충분히 환기시킨 후 농작업을 실시하십시오.
 - 신체에 이상이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
 - 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
 - 연소성이 있기 때문에 화기나 직사광선을 피해야 하며, 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- * 화재의 위험이 있으니, 반드시 동봉된 심지를 이용하여 점화하시기 바랍니다.
- 심자화과의 작물에는 약해의 우려가 있습니다.

훈연제의 점화 방법

- 자사의 훈연제에는 점화용 심지가 예비심지를 포함하여 한 캔에 두 개씩 포함되어 있음.
- 훈연제의 사용에 있어서 점화를 할 시에는 반드시 점화용 심지 한 개만 사용하시고, 예비 심지는 점화되는 캔 주위에서 완전히 제거하여 주시기 바랍니다.
- 또한 훈연제 점화시에는 점화되는 캔 주위에 인화성 물질이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

스미렉스
원예용
살균제

120 | 스미렉스 과립훈연제

잘못된 사용방법

1 심지를 정중앙이 아닌 다른 위치에 삽입하는 경우



▶ 심지가 타는 도중 꺼질 수 있음

2 심지를 한 개 이상 사용하는 경우



▶ 불꽃이 발생하면서 화재 위험이 있음

3 심지 외 다른 방법으로 점화하는 경우



▶ 불꽃이 발생하면서 화재 위험이 있음

4 별판 위에 제품이 있는 상태로 점화하는 경우



▶ 불꽃 발생으로 화재 위험이 있으니 안으로 밀어넣은 후 심지 점화

올바른 사용방법

1 제품과 점화기를 준비하십시오.



2 캔 뚜껑 손잡이를 당겨서 개봉하십시오.



▶ 심지 및 제품이 수분에 취약하므로 개봉 후 바로 사용하십시오.

3 비스듬한 심지를 정중앙에 안으로 밀어 넣으며 똑바로 세우십시오.



4 심지에 불을 붙이십시오.



5 연기가 나는 것을 확인하십시오.



6 연소 완료 후 캔이 완전히 식은 다음 폐기하십시오. (화상 위험이 있음)



원예용
살균제