

그 명성 그대로
잣빛곰팡이병 전문약제

스미렉스



수화제

- ▶ 잣빛곰팡이병 전문약제
- ▶ 긴 잔효력
- ▶ 약효 지속기간이 길어 안정적인 효과 발휘

품목명 : 프로사이미돈 (50) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 100g x 100EA | 작용기작 : 마3

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
거베라	잣빛곰팡이병	발병 초부터 7일 간격 경엽처리	20g	-	-
고추(단고추류 포함)		발병 초부터 경엽처리		수확 5일 전	3회 이내
딸기		개화직전부터 경엽처리		-	-
백합	잎마름병	발병 초부터 7일 간격 경엽처리	20g	-	-
복숭아	잣빛무늬병			수확 14일 전	3회 이내
부추	잣빛곰팡이병			수확 21일 전	2회 이내
수박	덩굴마름병	발병직전이나 발병 초부터 10일 간격 경엽처리	20g(1ℓ/m ²)	수확 5일 전	3회 이내
오이	잣빛곰팡이병	발병 초부터 경엽처리		-	-
잔디	동전마름병	발병 초 10일 간격 토양관주처리		-	-
토마토	잣빛곰팡이병	발병 초부터 경엽처리	20g	수확 7일 전	1회 이내
포도				수확 14일 전	3회 이내

주의사항

- ▶ 석회유황합체, 석회보르도액 등 알칼리성 약제 및 유기인계 나크(세빈)제와는 섞어 쓰지 마십시오.
- ▶ 보온육묘 기간과 연약한 묘 및 고온 다습 시에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 대발생 지역에서는 약효가 충분히 발현되지 않을 수 있으므로 예방적으로 사용하십시오.
- ▶ 이 농약은 당일 개봉하여 당일 사용하는 것이 가장 좋고, 개봉한 그대로 보관하였다 사용하면 약효가 떨어질 수 있습니다.
- ▶ 눈에 대한 자극성이 있으므로 눈에 들어간 경우 바로 물로 씻고 안과의사의 진찰을 받으십시오.
- ▶ 십자화과의 작물에는 약해가 발생하오니 약액이 날리지 않도록 주의하여 주십시오.

취급제한 기준

- ▶ 고춧잎 식용 사용 불가

원예용
살균제

122 | 스미렉스 수화제