

세균병 전문 항생제

스타나마이신



수화제

- ▶ 세균병 방제 전문 항생제
- ▶ 서로 다른 계통의 전문 항생제의 조합으로 구성
- ▶ 저항성이 생긴 세균에도 효과적으로 사용

품목명: 옥솔린산+스트렙토마이신 (10+15)% | 약효보증기간: 4년 | 특성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 200g x 80EA, 500g x 20EA | 작용기작: 가4+라4

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용시기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
고추 단고추류	세균점무늬병	발병 초 경엽처리	20g	수확 5일 전	3회 이내
마늘	무름병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	4회 이내
매실	궤양병	낙화직후부터 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전	3회 이내
무	무름병	발병 초 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
배	화상병	만개 5일 후부터 10일 간격 경엽처리		만개 후 15일	2회 이내
복숭아	세균구멍병	발병직전 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
사과	화상병	만개 5일 후부터 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전	2회 이내
양앵두(체리)	세균구멍병	발병직전 10일 간격 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내
양파	구씩음병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내
자두	세균구멍병	발병직전 10일 간격 경엽처리		수확 21일 전	4회 이내
참다래(키위)	궤양병	3월 하순부터 낙화직후까지 10일 간격 경엽처리		수확 30일 전	3회 이내
콩	불마름병	발병 초 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내

주의사항

- ▶ 자두, 복숭아 신엽 생장기에는 약해 발생 위험이 있어 사용하지 마십시오.
- ▶ 세균병해는 예방위주로 방제가 필요합니다.
- ▶ 고온기 사용시 약해 우려가 있으므로 아침, 저녁 햇볕이 약할 때 방제 작업을 실시하십시오.

방제효과

복숭아 세균구멍병



▲ 스타나마이신



▲ 무처리



원예용 살균제