

쏘나란



유제

- ▶ **잡초 발생 전 토양처리 발제초제**
잡초의 발아를 억제하고, 잡초뿌리 생장을 저해, 고사시킴
- ▶ **일년생 화본과잡초 및 광엽잡초 방제에 효과적**
화본과잡초 : 피, 바랭이, 강아지풀, 뚝새풀
광엽 및 사초과잡초 : 쇠비름, 명아주, 별꽃, 개비름, 망초, 냉이, 여뀌, 방동사니류
- ▶ **토양이동성이 적기 때문에 적용대상 작물에 안전**
약제 처리층이 땅속 수 cm 이내에 형성되기 때문에 깊게 심긴 작물에 안전

HOT

품목명 : 에탈플루랄린 (35) % | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 II 급 | 포장단위 : 300mL x 30EA | 작용기작 : K1

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a) 당 사용약량
감자	일년생 잡초	파종복토 후 3일 이내 토양처리	300mL
고추		비닐멀칭(정식) 전 토양전면처리	200mL
귀리		파종·정식기 토양처리	
당근		파종복토 후 3일 이내 토양처리	300mL
마(산약)		파종복토 후 비닐멀칭 전 토양처리	
마늘		파종복토 후 3일 이내 토양처리	500mL
보리		파종복토 후 3일 이내 토양처리	
생강		비닐멀칭 전 토양전면처리	
수박		정식 전(비닐멀칭 전) 토양처리	300mL
양파		파종복토 후 3일 이내 토양처리	
울무			
콩			



249 | 쏘나란 유제

주의사항

- ▶ 이미 발생된 잡초와 작물의 그루터기 등은 깨끗이 없앤 후에 뿌리십시오.
- ▶ 이식 작물은 이식할 때 약제 처리층의 흙이 뿌리에 묻지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 심한 모래땅이나 진땅에서는 약해의 염려가 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 터널재배나 하우스내 등 밀폐된 지역에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 비닐멀칭 재배를 할 경우 약제 처리후 약액이 건조된 후 비닐 멀칭을 하십시오.
- ▶ 약제 처리시 토양 입자가 잘 분쇄되지 않아 흙덩어리가 불균일하면 약효가 저하될 수 있으니 토양분쇄 작업을 잘 하신 후 약제를 살포하십시오.
- ▶ 양파 묘상에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 농약은 자동차, 벽 등의 도장면, 대리석, 화강암에 살포액이 묻으면 변색할 우려가 있으므로 살포액이 묻지 않도록 주의하십시오.
- ▶ 겨울철에는 얼지 않도록 섭씨 5도(℃) 이상에서 보관하십시오.