

오로지

입제



- ▶ **저항성 잡초, 피, 일·다년생 광엽 및 사초과 잡초에 우수한 초·중기 제초제**
저항성 물달개비(2엽 이내), 저항성 올챙이고랭이(2엽 이내) 방제
피 2~2.5엽기 이내 우수한 효과
- ▶ **강력한 제초효과!**
잡초 잎, 줄기, 뿌리로 흡수 > 잡초 세포분열 억제
토양표면에 강하게 흡착 > 약제처리층 형성

품목명: 브로모부타이드 + 프로피리살퓨론 + 티오벤카드 (3+0.25+5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 3kg x 8EA | 작용기작: Z+B+N

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (어린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 발뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 자귀풀, 사마귀풀) 및 다년생 잡초 (올방개, 벼풀, 올챙이고랭이)	이앙 후 10~12일 수면처리	3kg

효과적인 사용방법

- ▶ 썬레질 작업을 균일하게 하고 썬레질 후 2~3일경 모를 2~3cm 깊이로 이앙한 후 논물을 3~4cm 정도로 대고 이앙 후 10~12일 (썬레질 후 12~14일) 이내에 논 전면에서 골고루 뿌려주십시오.
- ▶ 썬레질 후 이앙시기가 늦어지거나 올방개, 벼풀 등 난방제 잡초가 많은 논에서는 썬레질 후 이앙 전 처리제를 살포하시고 이앙 전 처리제 사용 후 15일경에 이 제품을 처리하십시오.
- ▶ 약을 뿌린 후 최소 3~4일간은 논물이 마르지 않도록 논물관리를 철저히 해 주십시오.
- ▶ 전년도에 저항성잡초의 발생이 많았던 논에는 반드시 썬레질 후 바로 이앙 전 처리제를 살포하여 체계처리 하십시오.

주의사항

- ▶ 모래논, 물빠짐이 심한 논(물빠짐: 2cm 이상/일), 야산개답지, 유기물 함량이 낮은 척박한 논(새로 개간한 논이나 경지 정리한 논), 찬물이 나는 논, 고냉지 등 부적절한 곳에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 생벼짚 등 미숙퇴비를 사용하여 가스발생이 우려되는 논에서는 벼 뿌리의 활착력이 떨어져 생육이 억제될 수 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 제품은 피를 2~2.5엽기까지 방제합니다. 썬레질 후 이앙까지 기간이 3일 이상 되는 포장이나 썬레질 후 고온으로 피의 생장이 빠를 경우에는 피에 대한 효과가 떨어질 수 있으므로 이와 같은 포장에서는 반드시 이앙 전 처리제나 초기 일년생 제초제와 체계처리 하십시오.
- ▶ 이 제품은 썬레질이 잘 되지 않아 논바닥이 논물 위로 드러난 논이나 모가 완전히 물에 잠기는 논에서는 약해가 발생할 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 제품을 처리한 후에 논물이 마르게 되면 약효가 떨어지고 약해가 발생할 수 있으므로 물이 마르지 않도록 논물관리를 철저히 해 주십시오.
- ▶ 모의 이앙상태가 고르지 않거나 생육상태가 좋지 않은 논, 부실한 모를 이앙한 논, 모가 극히 얇게 심겨진 논, 모의 뿌리가 노출되었거나 활착되지 않은 논에서는 약해가 발생할 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 조류(논이끼)나 개구리밥의 발생이 많거나 벼짚 등 부유물이 많은 논에서는 약제 확산에 지장을 받아 약효가 떨어질 수 있으므로 제거한 후 사용하십시오.
- ▶ 이상기후(이상고온, 이상저온, 과습, 건조 등)에서는 약해 우려가 있으므로 주의하십시오.