

올카바



유제

- **긴 약효 지속기간**
데실알코올과 뷰트랄린 혼합제로 일반 알코올류 약제보다 효과가 깁니다.
- **속효성, 내우성이 뛰어남**
처리 후 수 시간 후에 액아가 고사되며, 6시간 후에 비가와도 효과가 떨어지지 않습니다.
- **2차 처리시 (1차 처리 후 15일 후) 에는 경엽살포 가능**
손으로 일일이 점적처리 하지 않고, 2차 처리시 분무기로 경엽살포 할 수 있습니다.

품목명 : 뷰트랄린 + 데실알코올 (8+48) % | 약효보증기간 : 3년 | 독성 : 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위 : 500ml x 20EA | 작용기작 : K1+비대상

적용 대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	사용약량
담배	액아억제	적심 후 액아 2~3cm 일 때 주경상단부 점적처리	500ml	20ml/주

효과적인 사용방법

- 꽃대가 10~20cm 정도 나왔을 때 [발뢰중기] 착엽수가 황색종은 15엽 이상, 버어리종은 21엽 이상이 되도록 적심한 후 사용하십시오.
- 적심후 액아가 1~2cm 정도 나왔을 때 희석액을 담배 원줄기의 상단부에서 하위부의 액아로 흘러 내리도록 사용하십시오.
- 약제를 희석할 때는 약액을 희석통에 먼저 넣고 잘 저어가며 물을 서서히 증가시키고, 살포할 때는 수시로 흔들어서 주어 약액이 잘 섞이도록 해주십시오.
- 40배의 희석액을 주당 20ml 정도로 담배 원줄기의 상단에서 똑바로 떨어져 액아에 잘 맞도록 살포하십시오.
- 배부식 분무기 1통 (용량 : 18ℓ) 당 500ml 사용하십시오.

올카바 사용 표준 경작법

- **황색종 버어리종 공통**
 - 적심
 - 올카바 또는 콘택트 유제 + 뷰트랄린 유제 점적처리
 - 1차처리 15일 후 올카바 또는 콘택트 유제 + 뷰트랄린 유제 점적처리



처리적기

- 1차 : 적심 직후 2차 : 1차 처리 후 15일경



원예용 기타제