

# 임페리얼



## 과립훈연제

- ▶ 비가 오는 날, 흐린날 간편하게 사용  
시설내 습도가 높아 곰팡이 방제가 어려운 시기에 효과적으로 사용 가능
- ▶ 인축 독성이 적어 작업자에 안전
- ▶ 수확물에 약흔이 남지 않아 사용에 편리

품목명 : 프로사이미돈 + 디에토펜카브 (18+12)% | 약효보증기간 : 4년 | 독성 : 저독성, 어독성 III급 | 포장단위 : 40g x 100EA | 작용기작 : 마3+나2

## 적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
딸기	젯빛곰팡이병	발병 초부터 7일간격 훈연처리	120g	수확 2일 전	3회 이내

## 주의사항

- ▶ 정식 직후나 유묘기, 연약한 묘에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
  - ▶ 지나친 과습 시에는 약해 발생의 우려가 있으므로 관수 직후 또는 작물이 젖어 있을 때나 하우스 내에 안개가 자욱히 끼어 있을 때는 사용하지 마십시오.
  - ▶ 훈연 시 곧바로 분출되는 짙은 연기가 식물체에 직접 닿을 경우 약해의 우려가 있으므로 약제와 작물체와의 거리를 50cm 이상 간격을 띄우시고 과립훈연제의 열기에 의하여 비닐하우스가 손상될 우려가 있으므로 충분한 간격을 유지하여 설치하십시오.
  - ▶ 바람이 강하게 부는 날은 약 성분이 한쪽으로 몰려 약효저하 또는 약해의 우려가 있습니다.
  - ▶ 훈연 작업 시에는 마스크, 고무장갑 등을 착용하여야 하며 작업 후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
  - ▶ 약제를 훈연하기 전에 과립훈연제를 놓은 주변에 인화성 물질을 모두 제거하십시오.
  - ▶ 훈연 중에는 하우스 내 출입을 금하여야 하며, 훈연이 끝난 후에는 밀폐된 하우스를 충분히 환기시킨 후 농작업을 실시하십시오.
  - ▶ 신체에 이상이 있을 때는 약제살포 및 취급을 금합니다.
  - ▶ 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
  - ▶ 연소성이 있기 때문에 화기나 직사광선을 피해야 하며, 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- \* 화재의 위험이 있으니, 반드시 동봉된 심지를 이용하여 점화하시기 바랍니다.**

## 훈연제의 점화 방법

- ▶ 자사의 훈연제에는 점화용 심지가 예비심지를 포함하여 한 캔에 두 개씩 포함되어 있음.
- ▶ 훈연제의 사용에 있어서 점화를 할 시에는 반드시 점화용 심지 한 개만 사용하고, 예비 심지는 점화되는 캔 주위에서 완전히 제거하여 주시기 바랍니다.
- ▶ 또한 훈연제 점화 시에는 점화되는 캔 주위에 인화성 물질이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

## 올바른 사용방법

- 1 제품과 점화기를 준비하십시오. 
- 2 캔 뚜껑 손잡이를 당겨서 개봉하십시오. 
- 3 비스듬한 심지를 정중앙에 안으로 밀어넣으며 똑바로 세우십시오. 
- 4 심지에 불을 붙이십시오. 
- 5 연기가 나는 것을 확인하십시오. 
- 6 연소 완료 후 캔이 완전히 식은 다음 폐기하십시오. (화상 위험이 있음) 

▶ 심지 및 제품이 수분에 취약하므로 개봉 후 바로 사용하십시오.



원예용 살균제