

잡초 발생초기에도 사용
산소엔 잔디로

잔디로



입상수화제

- ▶ 잡초의 경엽과 뿌리를 통해 흡수, 이행되어 우수한 살초력을 발휘하는 잔디제초제
잡초 발생 전 ~ 잡초크기가 10cm 정도까지 방제되며, 사용시기의 폭이 넓어 한여름의 고온기를 제외하고 거의 1년 내내 사용할 수 있는 잔디제초제
- ▶ 바랭이, 새포아풀 등 화본과잡초, 쑥, 토끼풀, 망초, 냉이, 닭의장풀 등 광엽잡초, 기타 방동사니에 효과
- ▶ 약효지속기간이 길어서 처리 후 발생하는 잡초를 효과적으로 억제시킨다.

품목명: 플루세토설펜론+이마자퀸 (5+10)% | 약효보증기간:4년 | 독성:저독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위: 50g×100EA | 작용기작:B+B

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
한국잔디(잡초발생 전)	일년생 잡초 및 다년생 잡초	잡초발생 전 토양처리	500g
한국잔디(잡초생육 초기)		잡초생육 초기(바랭이 3엽기) 경엽처리	

효과적인 사용방법

- ▶ 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 잡초에 충분히 묻도록 뿌려 주십시오.
- ▶ 이 농약은 잡초 발생 전에는 물론 잡초 생육기에도 처리할 수 있는 약제입니다.
- ▶ 잡초 생육기 약제 처리 시, **경엽처리효과 뿐만 아니라 잡초발아 억제효과**도 있어서 오랜기간 잡초를 억제 시키므로 1년에 2회 살포하면 잔디발 잡초를 효과적으로 방제할 수 있습니다.
- ▶ **100㎡ 규모의 잔디에 사용할 경우에는 물20L에 이 농약 50g**을 넣고 잘 희석하여 살포하십시오.
- ▶ **잡초발생상태를 고려하여 아래와 같이 사용하시면 효과적인 잡초방제를 할 수 있습니다.**
 - 초봄(~3월말): 잡초 발생 전(잔디의 휴면기)에 살포하면 균일한 처리층이 형성되어 잡초가 지상으로 오지 못하게 하거나 잡초의 생육을 억제합니다.
 - 봄, 여름: ①바랭이 등 화본과 잡초가 많이 발생하는 곳에서는 바랭이 3~4엽기 정도 자랐을 때 살포하십시오.
②쑥, 냉이, 망초, 쇠비름 등 광엽잡초가 많이 발생하는 곳에서는 광엽잡초가 5cm 정도 자랐을 때 살포하십시오.
③파대거리, 향부자 등 방동사니과 잡초가 많이 발생하는 곳에서는 잡초가 4~5엽 자랐을 때 살포하십시오.
 - 가을: ①월동잡초인 새포아풀은 발생초기 방제가 가능합니다.
②다른 잡초와 새포아풀을 동시에 방제하고자 할 경우에는 새포아풀 발생초기에 약제를 살포하십시오.

주의사항

- ▶ 이 농약은 잔디가 완전히 조성된 들잔디, 금잔디 등 난지형 잔디에만 사용하십시오. 서양잔디(한지형잔디)에는 약해가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 서양잔디 주변이나 약액이 서양잔디에 흘러 들어가 약해가 우려되는 곳에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 잔디의 생육이 불량하거나 고온기에는 잔디 잎 끝이 황변되는 약해가 발생할 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 약제 살포 후 24시간 이내에 강우가 있을 경우에는 약효가 떨어질 수 있으므로 강우예상 시에는 사용하지 마십시오.
- ▶ 이 농약은 잡초를 서서히 고사시키는 특성을 가지며 완전히 고사하는 데까지는 약 20~30일 정도 소요됩니다.
- ▶ 수목주변에는 약해가 발생할 수 있으므로 사용하지 마십시오.

