

흑미·찰벼에도 안전하다

정면돌파

액상수화제



- ▶ 흑미, 찰벼, 다수성 품종에 약해 없이 사용 가능
- ▶ 저항성 올챙이고랭이, 물달개비에 고루 효과
- ▶ 저항성 피에 대한 효과가 우수한 성분 포함


품목명: 브로모뷰타이드 + 펜트라자마이드 + 이마조설프론 (18+6+1.5)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 500mL × 20EA | 작용기작: Z+K3+B

적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용적기 및 방법	1,000m ² (10a)당 사용약량
기계이앙벼 (여린모)	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌바늘, 밭뚝외풀, 알방동사니, 가막사리, 여뀌, 자귀풀) 및 다년생 잡초 (벗풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	이앙 후 10~12일 수면처리	500mL
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌, 여뀌바늘, 밭뚝외풀, 알방동사니) 및 다년생 잡초 (벗풀, 올방개, 올챙이고랭이, 너도방동사니)	이앙 후 5~7일 원액 수면점적처리	
	일년생 잡초 (피, 물달개비, 밭뚝외풀, 미국외풀, 여뀌바늘) 및 다년생 잡초 (너도방동사니, 올방개, 올챙이고랭이) (무인항공기)	이앙 후 10~12일 원액 수면적하처리	
	년생 잡초 (피, 물달개비, 여뀌, 밭뚝외풀, 자귀풀) 및 다년생 잡초 (벗풀, 올방개, 올챙이고랭이)	써레질 직후~이앙 2일 전 원액 수면점적처리	400mL

효과적인 사용방법

- ▶ 물높이를 3~5cm로 유지한 후 3~4 걸음에 한번씩 논 전체에 골고루 살포해 주십시오.
- ▶ 약해의 우려가 있으니 분무기 사용시 노즐을 액상 전용 노즐을 사용하여 안개처럼 분무되지 않도록 해 주십시오.
- ▶ 논폭이 20m 이상으로 넓은 경우에는 논 가운데로 들어가 좌우로 살포해 주십시오.




정면돌파
A약제
B약제

효과적인 살포방법



▶ 논폭이 20m인 경우: 논둑을 돌면서 3~4걸음에 1회 살포



▶ 논폭이 30m~40m인 경우: 논둑을 돌면서 3~4걸음에 1회 살포, 논 가운데를 걸으면서 2걸음에 1회 좌우 살포

수도용
제초제