

비오거나 흐린 날에는 꼭 챙기세요

젬머



과립혼연제

- ▶ 비가 오는 날, 흐린날 간편하게 사용
시설내 습도가 높아 곰팡이 방제가 어려운 시기에 효과적으로 사용 가능
- ▶ 침투이행효과가 있어 우수한 방제효과를 나타내고 약효지속성이 우수
- ▶ 수확물에 약흔이 남지 않아 사용에 편리

품목명: 플루사피록사드 (9)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 I 급 | 포장단위: 50g x 100EA | 작용기작: 다2

적용 병해 및 사용량

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
고추(단고추류 포함)	젓빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 혼연처리	150g	수확 2일 전	3회 이내
딸기	꽃곰팡이병				2회 이내
	흰가루병				
부추	젓빛곰팡이병			2회 이내	
상추(양상추 포함)	균핵병			3회 이내	
토마토(방울토마토 포함)	젓빛곰팡이병			수확 3일 전	2회 이내
	잎곰팡이병				



원예용 살균제

135 | 젬머 과립혼연제

국내 시험 사진(딸기 젓빛곰팡이병) | 동방아그로 기술연구소



주의사항

- ▶ 이 농약은 온실, 하우스 전용약제이므로 일반노지 및 비닐터널재배에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 정식 직후나 유묘기, 연약한 묘에는 약해의 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 지나친 과습시에는 약해발생의 우려가 있으므로 관수 직후 또는 작물이 젖어 있을 때나 하우스 내에 안개가 자욱히 끼어 있을 때는 사용하지 마십시오.
- ▶ 이상고온이나 이상저온인 경우에는 작물이 연약한 상태이므로 사용을 피해주십시오. 또한 고온인 경우에는 온도가 낮아지는 저녁 무렵에 하우스를 밀폐한 후 사용하십시오.
- ▶ 혼연 시 곧바로 분출되는 짙은 연기가 식물체에 직접 닿을 경우 약해(축엽, 위축증상 등)의 우려가 있을 수 있으므로 약제와 작물 체와의 거리를 50cm 이상 간격을 띄워주시고 과립혼연제의 열기에 의하여 비닐하우스가 손상될 우려가 있으므로 50cm 이상 충분한 간격을 유지하여 설치하십시오.