

원예작물 세균병에  
우수한 효과

# 차트라



## 입상수화제

- ▶ **곰팡이와 세균을 동시에**  
가스가마이신과 폴리옥신디의 혼합제로 세균과 곰팡이를 동시에 방제
- ▶ **침투이행 효과가 있어 안정적인 효과 발휘**
- ▶ **원에 전문 살균제**  
여러 원예작물에 폭넓게 사용할 수 있는 원예 전문 살균제

품목명: 가스가마이신+폴리옥신디 (9+4)% | 약효보존기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성Ⅲ급 | 포장단위: 100g×100EA, 250g×40EA | 작용기작: 라3+아4

### 적용 병해 및 사용량


작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준		
				시기	횟수	
가지	갈색무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리	10g	수확 7일 전	1회 이내	
고추(단고추류 포함)	갈색점무늬병			발병 초 7일 간격 경엽처리	수확 3일 전	3회 이내
	세균점무늬병	수확 14일 전			1회 이내	
꽃양배추(브로콜리, 콜리플라워 포함)	무름병	발병 초 경엽처리		수확 7일 전	3회 이내	
냉이	흰가루병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내	
단호박	세균점무늬병			수확 7일 전	3회 이내	
마늘	잎집썩음병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내	
맥문동	붉은점무늬병			수확 7일 전	3회 이내	
머위	갈색점무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내	
멜론	흰가루병			수확 7일 전	3회 이내	
무	무름병	발병 초 10일 간격 경엽처리	수확 14일 전	4회 이내		
	노균병		수확 3일 전	3회 이내		
배추	무름병	발병직전 7일 간격 경엽처리	5g	수확 30일 전	3회 이내	
	밑동썩음병					발병 초 7일 간격 경엽처리
벼	목도열병	출수 7일 전 경엽처리	5g	수확 14일 전	2회 이내	
	잎도열병	발병 초 경엽처리				
부추	젓빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10g	수확 7일 전	3회 이내	
	밑동썩음병					발병 초 10일 간격 경엽처리
상추(양상추 포함)	갈색점무늬병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	수확 21일 전	
	균핵병					발병 초 10일 간격 경엽처리
수박(복수박 포함)	덩굴마름병	발병 초 7일 간격 경엽처리		10g	수확 14일 전	
시금치	노균병					발병 초 10일 간격 경엽처리
양미나리(셀러리)	검은점무늬병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 14일 전	3회 이내	
양배추	무름병					발병 초 10일 간격 경엽처리
양파	노균병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 3일 전	-	
오이	흰가루병					발병 초 7일 간격 토양관주처리
잔디	갈색잎마름병	발병 초 7일 간격 토양관주처리	20g(1ℓ/㎡)	-	-	
	라이족토니아마름병					



원예용  
살균제

작물명	적용 병해	사용적기 및 방법	물 20ℓ당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
쪽파	젓빛곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리	10g	수확 14일 전	2회 이내
참외	흰가루병	발병 초 10일 간격 경엽처리		수확 3일 전	3회 이내
토마토 (방울토마토 포함)	잎곰팡이병	발병 초 7일 간격 경엽처리		수확 14일 전	2회 이내
파 (쪽파 포함)	무름병				
호박	세균점무늬병				

### 방제효과 시험 (배추 무름병)



### 효과적인 사용방법

발병시기 예방적으로 뿌려 주시면 효과적입니다.

### 대상 병해



▲ 고추 세균점무늬병



▲ 배추 노균병



▲ 배추 무름병



▲ 토마토 잎곰팡이병



원예용  
살균제