

성묘길 벌초문제  
이젠 간편하게

# 카이저

입제



- ▶ 편하게 사용하는 입제형 잔디 제초제
- ▶ 바랭이, 새포아풀 등 화본과잡초, 썩, 토끼풀, 망초, 냉이, 닭의장풀 등 광엽잡초, 기타 방동사니에 효과
- ▶ 약효지속기간이 길어서 처리 후 발생하는 잡초를 효과적으로 억제시킨다.

품목명: 디클로베닐 + 이마자퀸온 (3.5+1)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III 급 | 포장단위: 500g x 20EA | 작용기작: L+B

## 적용 잡초 및 사용량

작물명	적용 잡초	사용시기 및 방법	1,000㎡ (10a)당 사용약량
비농경지 한국잔디	일년생 잡초 및 다년생 잡초	잡초발생 전 토양처리	10kg
			5kg

## 작용기작

- ▶ 디클로베닐: 흡수이행형 토양처리제로 주로 뿌리로 흡수하여 세포분열을 억제하여 고사시키는 작용을 한다. 토양 중에 이동성이 작고 휘산 정도가 낮아 약효지속 기간이 길다.
- ▶ 이마자퀸: 바린, 루이신, 이소루이신의 생합성을 억제하여 세포분열을 억제한다. 식물의 뿌리와 경엽을 통해 흡수되어 물관과 체관을 통해 이동한다.

## 효과적인 사용방법

- ▶ 잡초 발생 전 토양표면을 잘 고른 다음 적절한 사용량을 골고루 뿌리십시오.
- ▶ 이미 발생한 잡초는 방제 효과가 떨어지므로 약제를 사용하기 전에 잡초를 미리 제거한 후 사용하십시오.
- ▶ 토양의 전면적에 처리할 필요가 없을 경우에는 줄처리, 부분처리를 하면 효과적입니다.

## 주의사항

- ▶ 심한 강우가 예상되거나 극사질 토양에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 가뭄이 계속되어 토양이 건조한 경우에는 약효가 떨어지게 되므로 사용하지 마십시오.
- ▶ 토양과의 혼합처리를 하지 마십시오.
- ▶ 채소, 화훼, 온실, 비닐하우스에 인접한 장소 및 간작을 예정한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- ▶ 벤트그라스 등 서양잔디(한지형 잔디)에는 약해가 있으므로 서양잔디 주변이나 약이 서양잔디에 흘러 들어가 약해가 우려되는 곳에는 절대 사용하지 마십시오.
- ▶ 잔디의 발아초기 및 생육기에는 약해가 있으므로 반드시 잔디휴면기(11월말~이듬해 3월말)에 사용해야 합니다.
- ▶ 수목 주변에는 사용할 경우 약해가 날 우려가 있으므로 사용하지 마십시오.

원예용  
잔디제초제