

콘택트



유제

- ▶ **접촉형 액아 제거제**
살포액이 액아에 접촉하면 수 시간 후에 까맣게 타서 고사
적심 후 액아 1~2cm시 주경 상단부에서 점적처리
- ▶ **속효성 약제**
담배 종류와 관계없이 효과를 발휘한다.
효과가 빨라 처리 2시간 후에 비가 와도 효과 차이 없음
- ▶ **냄새가 거의 없다**
약제 처리 시, 냄새가 나지 않아 작업하기 편리하다.
- ▶ **환경에 대한 안전성**
약제 살포 후 빠르게 휘산되어 24시간 이내에 90% 이상 소실,
담배에 거의 잔류되지 않는다.

품목명: 데실알코올 (78)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 III급 | 포장단위: 300mL x 30EA

적용대상 및 사용량

작물명	적용대상	사용적기 및 방법	물 20L당 사용약량	사용약량
담배	액아억제	적심 후 액아 1~2cm 발생시 주경상단부 점적처리	500mL	20mL/주

사용시기

- ▶ 담배의 꽃대가 10~20cm 나왔을 때 (발리중기) 착엽수가 15엽 이상 되도록 적심한 후, 액아 1~2cm 정도 크기일 때 처리한다.
(최소한 상위엽의 엽장은 15cm, 엽폭은 8cm 이어야 한다.)

주의사항

- ▶ 살포적기와 살포약량을 반드시 지키십시오.
- ▶ 액아가 3cm 이상 신장한 경우에는 제거한 후 살포해 주십시오.
- ▶ 지하수 등 희석물의 온도가 낮을 경우 약효가 떨어지므로 미리 받아 놓은 물로 희석하십시오.
- ▶ 이 약제를 희석할 때에는 반드시 소정량의 약액을 희석통에 먼저 넣고 잘 저어가며 서서히 물을 증가시키고 살포할 때에는 수시로 흔들어서 약액이 잘 섞이도록 해 주십시오.
- ▶ 약제를 살포할 때는 정량분무기의 노즐 각도를 조절하여 약액이 원줄기 상단에 똑바로 떨어져 각각의 액아에 골고루 묻도록 살포하여 주십시오.
- ▶ 이 약제는 물보다 가벼워 물위에 뜨는 성질을 가지므로 이미 희석하여 살포하다 남은 약액을 (휴식, 점심 후 살포 시) 살포할 때에는 다시 약액을 잘 저어 살포하도록 하십시오.
- ▶ 이 약제는 맑은 날 살포하여야 하며, 비 온 뒤에는 잎에 물기가 마른 후 사용하십시오.
- ▶ 이 약제는 전착제와 혼용하지 마십시오.