

포지션



입제

- ▶ 딱 한번 처리로 벼의 주요 병해충을 방제
- ▶ 효과가 오래 지속되며 강력한 예방효과를 가짐
- ▶ 이앙 7일 전부터 이앙 당일까지 안전하게 사용

품목명: 트리사이클라졸 + 벤피라카브 (4+3.6)% | 약효보증기간: 4년 | 독성: 저독성, 어독성 || 급 | 포장단위: 1kg x 20EA | 작용기작: 자1+1a

적용 병해충 및 사용량

작물명	적용 병해충	사용적기 및 방법	1,000㎡(10a)당 사용약량	안전사용 기준	
				시기	횟수
벼	애멸구	이앙 7일 전 육묘상처리			
	잎도열병				
	목도열병				
	벼물바구미				
	벼잎물가파리	이앙당일 육묘상처리	50g/상자	이앙기	1회이내
	벼줄기굴파리				
	애멸구				
	이화명나방(1화기)				

효과적인 사용방법

- ▶ 물에 희석하지 마시고 육묘상자에 약제를 직접 골고루 뿌리십시오.
- ▶ 모에 물기가 묻어 있을 경우 잘 털어 주신 후, 1,000㎡당 이앙하고자 하는 육묘상자 20개에 1kg의 약제를 이앙 당일 골고루 살포 하시고, 잎에 묻은 약은 가볍게 털어 상토 위에 떨어지게 하십시오.
- ▶ 약제를 처리할 때와 처리한 후에는 모판에 물이 잠기지 않도록 주의하십시오.

주의사항

- ▶ 밀파되거나 불량환경 등으로 인한 연약한 모, 도장한 모, 생육이 불량한 모나 이앙적기를 지난 모(육묘기간 30일 이상) 등에 사용하거나 저온이 계속되어 뿌리의 생육이나 빠질 경우에는 약해가 발생할 수 있으니 사용하지 마십시오.
- ▶ 병해충 발생이 평년이상으로 대발생할 경우에는 적용대상 약제를 본답에 추가로 살포하여 주시기 바랍니다.

취급제한 기준

- ▶ 살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 근거리에서 직접 흘러 들어갈 우려가 있는 지역의 논에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오.

